le Ruficol, le Sasin en livrée de jeune âge, et l'Améthiste, jeune âge.

4^e^. *livraison contient :* Le Hausse-Col doré, mâle adulte, et la femelle ; le Colibri hirsute, adulte ; le Plumet bleu ou Oiseau-Mouche Delalande, jeune âge, et le Wied.

5^e^. *livraison.* Le Colibri topaze, jeune mâle en plumage incomplet ; le Colibri à plastron noir, jeune âge ; le Caraïbe, adulte ; l'Anna, jeune âge, et le Sasin, en plumage de deuxième année.

6^e^. *livraison.* Le Brin blanc, mâle adulte ; les Hausse-Col dorés, jeune femelle et jeune mâle ; les Oiseaux-Mouches à calotte d'azur, mâle adulte, et Arsenne, femelle.

7^e^. *livr.* Le Cyanure, l'Anaïs, le Chrysure, le Sasin, prenant sa 3^e^ livrée, et l'Améthiste, prenant son plumage d'adulte.

8^e^. *livr.* Le Grenat ; le Haïtien, adulte ; l'Oiseau-Mouche de Clémence, femelle ; l'Améthiste, prenant sa livrée d'adulte, et l'Ourissa, non adulte.

9^e^. *livr.* Le Colibri topaze, femelle ; l'Oiseau-Mouche Zémès, adulte ; l'Audenet, adulte ; les Oiseaux-Mouches Barbe bleue, jeune âge, et à Raquettes.

10^e^. *livr.* Le Ramphodon tacheté, mâle et son bec grossi ; le Langsdorff, jeune âge ; les Oiseaux-Mouches à calotte d'azur, jeune âge ; Avocette, jeune âge, et Arsinoë.

La 11^e^. comprend enfin l'Eriphise ; l'Arsinoë, adulte ; l'Oiseau-Mouche aux huppes d'or, femelle ; la Corinne, jeune âge, et la Nouna-Koali. D.

63. Catalogue des Reptiles qui font partie d'une Collection zoologique recueillie dans l'Inde continentale ou en Afrique, et apportée en France par M. Lamare-Piquot. Catalogue dressé (juillet 1830) par M. R.-P. Lesson.

N^os^. 1. Tortue d'eau douce à carapace noire. *Chersine retusa,* Merrem; Less. Rept. Voy. de Bélanger, pl. 1.

Carapace ovalaire à 13 plaques. Sternum oblong tronqué en avant, échancré en arrière, à 12 plaques. Tête noire bordée de jaunâtre. Carapace noire. OEuf ovalaire, oblong, très-blanc, long de 20 lignes.

Hab. les *Sandry-Bonn*, îlots placés à l'embouchure du Gange.

2. Tortue aréolée. *Chersine tetradactyla*, Merrem; Schn. pl 23.

Carapace bombée, ovalaire; gouttière sur les côtés. 24 plaques marginales. 13 centrales. Sternum échancré aux deux extrémités. Écailles de la carapace striées, aréolées.

Hab. le cap de Bonne-Espérance.

3. Tortue grecque, *Testudo græca*, L.

Hab. le cap de Bonne-Espérance.

4. Tortue rayonnée, *Testudo radiata*, Shaw.

Carapace voutée, très-bombée. 24 écailles marginales. Sternum bifurqué en arrière, échancré profondément en devant. OEufs ronds, blancs, très-gros, à enveloppe calcaire.

Hab. Madagascar.

5. Tortue à boîte de Madagascar, *Pyxis madagascariensis*, Less.

Carapace bombée, festonnée sur les bords. 24 écailles marginales, 13 dorsales. Sternum mobile, un peu échancré en avant, à 12 pièces, large en arrière.

Hab. Madagascar.

6. Tortue géométrique, *Testudo geometrica*, Linn.

Du cap de Bonne-Espérance.

7. Tortue élégante, *Testudo elegans*, Schn. pl. 25.

Du cap.

8. Émyde de Piquot, *Emys Piquotii*, Less.

Carapace bombée, échancrée en devant, ayant trois arêtes en restant en dessus. 25 écailles marginales. Sternum à 12 pièces, tronqué en avant, échancré en croissant en arrière. Pieds antérieurs, 5 ongles; les postérieurs, 4. Couleur de l'animal noir ponctué de jaune doré.

Hab. le Gange.

9. Émyde jaunoir, *Emys flavonigra*, Less.

Carapace bombée, convexe, à 13 écailles dorsales, à arête convexe, médiane, à 25 plaques sur

le pourtour; plastron à 12 pièces, échancré aux deux extrémités. Carapace noir-marron bordée de jaune.

Hab. le Gange.

10. Émyde à trois bosses, *Emys trigibbosa*, Less.

Carapace triangulaire, voûtée, à côtés déprimés dans le jeune âge, aux trois premières écailles médianes ongulées. 25 écailles marginales. Plastron ovalaire, aminci aux deux extrémités, tronqué en avant, échancré en arrière. 4 doigts seulement aux pieds de derrière.

Hab. le Gange.

11. Trionyx du Coromandel, *Trionyx coromandelicus*, Geoff., Merrem, esp. 3 : Scheff., pl. 30, fig. A, B.

Hab. les étangs, les marais du bord du Gange.

12. Trionyx du Gange, *Trionyx gangeticus*, Cuv., Guérin, Icon., pl. I, fig. 6

Hab. les îles de l'embouchure du Gange.

13. Chélonée marine, *Chelonia mydas*, L.

L'Océan atlantique.

14. La fausse Chélonée franche, *Chelonia pseudo-mydas*, Lesson.

L'Océan atlantique.

15. Le Caret, *Caretta cephalo*, Merrem, esp. 2.

L'Océan atlantique.

16. La Chélonée à sternum bicarené, *Chelonia bicarinata*, Less.

L'Océan atlantique.

17. Le faux Caret, *Chelonia pseudo-Caretta*, Lesson.

L'Océan atlantique.

18. Le Crocodile à deux arêtes, *Crocodilus biporcatus*, Cuv. : *Comice* des Indous.

Le Gange.

19. Le Crocodile des marais, *Crocodilus palustris*, Less.

Le *Metcho-Comice* des Indous.

Long., 6 pieds $\frac{1}{2}$; maxillaire supér. 34, infér. 30; 4 écailles nucléales sur le cou; 6 grandes écailles en scutelles; 4 sur une ligne en haut et 2 en bas; 2 écailles à la 1re. rangée dorsale, 4 à la 2e., 5 à la

3e., puis jusqu'à 8 ; toutes les écailles très-finement rayonnées.

Hab. les marais saumâtres; ne va jamais dans le Gange.

20. Le Gavial du Gange, *Lacerta gangetica*, Gm.

Le fleuve dont il porte le nom.

21. Le Monitor à lignes, *Varanus vittatus*, Auct.

Les forêts les plus épaisses du continent indien.

22. Le Monitor à gouttelettes, *Varanus guttatus*, Merrem, esp. 3.

Les broussailles, les lieux les plus isolés de l'Inde.

23. Le Monitor ponctué, *Varanus punctatus*, Merrem, esp. 4.

Les broussailles, les petits bois du Bengale.

24. Le Gecko à doigts libres, *Gecko eleuthero dactylus*, Less.

Hab. le Bengale.

25. Le Naja Kaouthia, *Naja Kaouthia*, Less.

Belle espèce bien distincte du serpent Capel ou à lunettes. Plaques ventrales, 188; caudales, 53 paires.

26. Naja Capel ou à lunettes. *Naja Goerou*, Less.; *Coluber naja*, L.

Plaques ventrales, 180; caudales, 56 paires.

Le Bengale.

27. Vipère à anneaux, *Vipera elegans*, Daudin, *Chander-Boa* des Indous.

Plaques ventrales, 171; caudales, 48 paires.

Le Bengale.

28. Bongare à anneaux, *Bungarus annularis*, Merrem.

Le *Chankeney* au Bengale.

Plaques ventrales, 228 ; caudales, 34 simples.

29. Couleuvre boncorage, *Coluber boncorage*.

Plaques ventrales, 262; caudales, 92 paires.

Les forêts montagneuses.

30. Couleuvre Korros, *Coluber Korros*.

Plaques ventrales, 246; candales, 90 paires.

31. Python de la Sonde, le *Chitty-Boa* des habitans des montagnes du Bengale, qui éprouve une grande

élévation de température lorsqu'il *couve* ses œufs, au milieu de ses replis.

32. Crapaud du Bengale, *Buffo Bengalensis*, Daudin.

33. Grenouille de Brama, *Rana Brama*, Less. Voy. de Bélang., pl. 5.

Nota. Nous n'avons pas eu le loisir d'examiner une nombreuse suite de petits Reptiles conservés dans la liqueur, et parmi lesquels il y en a de fort intéressans. Nous avons vu entre autres un Caméléon très-noir et sans capuchon, qui nous paraît inédit. M. Lamare-Piquot a rédigé des notes très-intéressantes sur la plupart des espèces qu'il possède, et il est bien à désirer qu'il les publie; car l'histoire des Reptiles, sous le rapport de leurs habitudes et de leurs mœurs, est encore bien reculée. Les échantillons de M. Lamare-Piquot sont quelquefois au delà de cinquante individus pour quelques espèces.

64. Encyclopédie méthodique. Histoire naturelle des Vers; par Bruguière et Lamarck, continuée par M. G.-P. Deshayes, T. II, in-4°. de vii, 256 et 144 p. de texte sur 2 colonnes. Paris, 1830, M^me^. Agasse.

Bruguière n'avait publié que le 1^er^. vol. de l'Histoire naturelle des Vers, en 2 parties, en 1789, comprenant les lettres A à Con; le genre Cône terminait ce volume, et l'on sait que sous le nom de Vers ce naturaliste entendait tous les vers de Linné.

En 1824, MM. Lamouroux, Bory de Saint-Vincent et Eudes Deslonchamps ont publié, également en 2 parties, le T. II des Vers, pour faire suite à l'ouvrage de Bruguière; mais ce volume ne comprend que des Zoophytes et des Rayonnés, et il comprend tous les articles de A jusqu'à Z.

On est donc étonné de voir aujourd'hui publier un nouveau T. II des Vers, pour faire également suite à l'ouvrage de Bruguière; il devait former le vol. III.

Les 256 premières pages du demi-volume que nous annonçons, font un supplément au 1^er^. volume publié par Bruguière, supplément nécessité par toutes les découvertes et les changemens arrivés depuis lui dans la science. Il s'arrête, comme Bruguière, après le genre Cône. Une autre pagination