

Königsberger
A r c h i v
für
Naturwissenschaft
und
M a t h e m a t i k

von
F. W. Bessel, K. G. Hagen,
W. H. G. Reimer, A. F. Schweigger
und E. F. Wrede.

E r f t e r B a n d.

Mit einem Kupfer.

K ö n i g s b e r g,
bey Friedrich Nicolovius.
1 8 1 2.

Prodromus monographiae Cheloniorum auctore Schweigger.

Pars I.

P r a e m o n e n d a.

Prodromum monographiae testudinum jam mense Majo 1809 instituto gallico propositum tandem typis exscribendum trado. Animus tam quidem fuit ex auctoritate illustrissimae huius societatis sub eiusque auspiciis opus edendi: paulo post Regiomontium petens consilium relinquere coactus sum, et aliis negotiis omne studium impendere. Jam autem inchoatam telam pertexere conor, et plagulas hascè emitto, ut lectores de materia tractatu difficillima novas observationes nobiscum communicent, quibus in opere maiori iconibus illustrando gratissimo animo utamur. Quare hic non nisi ea protulimus, quae ad animalium distinctionem necessaria videbantur, specierum tamen novarum aut minus cognitarum accuratiorum adjecimus descriptionem, relinquentes ceterum synonyma quaedam, quae extricandi nondum occasio fuit.

Quum iam Regiomonti morarer, cel. Geoffroy, qui una cum V. V. illustriss. Lacepede et Lamark ex decreto instituti gallici opusculum meum examinandi

operam benigniter in se suscepit, propriam dissertationem de testudinibus mollibus conscriptam publici juris fecit; iisque nomen *Trionyx* imposuit, quia in speciebus hucusque cognitis digiti tres unguiculati et duo mutici inveniuntur. Adoptavi quod dedit nomen et delevi denominationem *Amydae* e Galeno desumptam, quam, novum hocce constituens genus, in manuscripto meo tunc temporis ei imposueram, id quod iam cel. viro monere placuit.*) Ceterum omnium specierum mihi notarum rationem habeam, excepta sola testudine squamosa Bontii (hist. nat. Ind. orient. Lib. V. Cap. 30. p. 82. c. fig.) quam iam Schoepfius omisit, quamque maiori iure ad genus *Manis* quam ad *Chelonios* referri omnia suadent, nec hancce speciem in insula Java a se unquam visam esse cel. peregrinator Lechenault certiore me fecit.

Supereſt ut perill. Cuvier summam in me benevolentiam grata mente agnoscam et optimo praeceptori Dumeril, qui plane insigni humanitate musei publici copiam mihi fecit, quantum debeam palam profitear, gratiasque agam V.V. celeberrimis Bose, Brongniart, Richard, Olivier, Lechenault, qui proprias collectiones maxima liberalitate aperuerunt, aliisque viris, quorum in me merita significandi infra occasio erit. Tu autem, Lector, vale, et cenaminibus nostris fave.

*) Mémoire sur les tortues molles, nouveau genre sous le nom de *Trionyx* par Geoffroy-Saint-Hilaire. Annal. du mus. d'hist. natur. Tom. XIV. p. 15.

Câput I.

Instituti ratio.

Hand est quod in prodromo loquer de diversis Cheloniorum divisionibus apud alios auctores, sed comparanda potius videtur eorum structura secundum genera, ut exinde methodus nostra appareat. Ordo nimirum qui a testudinibus mollibus ad marinas, paludosas et terrestres transit, admodum naturalis nobis visus est et egregium hic habemus auctorem cel. Blumenbach. *) Qualis enim a tenera aetate ossificatio testae sensim a vertebrae ad marginem tendit, costis sic in maiorem latitudinem crescentibus, talis observatur per singula genera in adultis, ita quidem ut quoddam genus proprium quasi ossificationis loricae momentum repraesentet. In Trionychibus nimirum licet adultis, costae, simili modo quam in ceteris Chelonis neonatis tantummodo prope vertebrae connatae sunt, versus marginem liberae. Similis est conformatio testae in Cheloniarum speciebus, etenim in testis trium pedum et ultra costas prope marginem nondum plane ossificatas, sed cartilagine tantum conjunctas vidi; et admodum verisimile est, laminae interstitiorum costarum in omni aetate prope marginem tenues permanere. **)

*) Cel. auctor in libro: Anfangsgründe der Naturgeschichte testudine membranacea ordinem Cheloniorum incipit,

**) Aliter res sese habuit in Chelonia quadam fossili, quae 13 poll. longa iam testam ubique ossificatam et undique cum margine connatam exhibuit. Cfr. Cuvier sur les ossements fossiles des tortues. Annal. du mus. d'hist. nat. XIV. p. 234.

Eadem fere est testae structura in genere nostro Chelydra, eandemque observavimus in Chelyde speciebusque nonnullis Emydum; etenim interstitia costarum prope marginem jam juniori quidem aetate laminis ossis expleta vidimus, sed cuiusvis aetatis tenuissima. Pleraeque contra Emydes habent discum celerius ossescentem, versus marginem in adultis solidissimum et intus cum illo concretum. Breviori etiam tempore in testudinibus proprie sic dictis costae ex omni parte coalescunt sensim sensimque intumescunt; quum autem, jam contiguae et margine officato, difficilius in maiorem latitudinem extendi possint, ossa curvari et testam convexiorem reddi, quam in reliquis speciebus, necesse est. Tanta enim illis innascitur vis nutritionis, ut costae, quae prima aetate bene discernebantur, licet dilatatae et ex omni parte conjunctae, paulatim evanescant, in unam massam colliquefcentes.

Margo testae in omnibus testudinibus seorsum a disco ossescit, propria puncta ossificationis sibi vindicans. Ossibus ut plurimum viginti quatuor constituitur, quorum anticum latissimum in omnibus fere Cheloniorum speciebus invenitur, minoris tamen latitudinis in terrestribus quam aquatilibus. Prima huius ossis vestigia jam in Trionychibus, saltem in granoso, japonico et subplano, reperiuntur cum offiulis quibusdam marginis testae postici.*) Latera autem annuli marginalis Trionychum cartilaginea permanent, ex observatione ccl. Geoffroy natatui inservientia: ceterum omnino et hic, uti in

*) Vid. fig. Trion. subplani in *Annal. du mus. d'hist. natur.* Tom. XIV. tab. 5.

reliquis speciebus, margo appendicibus costarum sternalibus comparandus erit. In Cheloniarum speciebus margo ex omni parte offensus cum sterno, ligamentis et cartilagine conjungitur, idemque per symphyfin sterni adhaeret in Chelydri, Chelyde, Plerisque Emydibus; tandem, ossificatione aucta, cum sterno tam intime coalescit, ut in speciebus testae solidissimae, qualis testudo indica et gigantea vix marginis vestigium in lateribus supersit, et testa cum sterno in cylindrum transformetur. Sic a testudinibus mollibus ad terrestres progredientes, testam magis magisque convexam conspicient.

Eodem ordine, quo lorica solidior enascitur, eodem et sterni ossificatio augetur. Sternum Cheloniarum novem ossibus formatur, vario modo conjunctis secundum genera. Sternum testudinum mollium est annulus intracorum abdominis receptus et testae ligamentis tantum adhaerens. Ossa nimirum duo parallela, generi Trionyx propria, cum margine antico ossis semilunaris connectuntur, quod in tenerissima aetate, simili modo quam in ceteris Cheloniarum speciebus, ex duabus partibus componitur, ut sternum Trionychum ex decem ossibus constructum rectius forsitan diceres. Hoc autem os arcuatam partem sterni anticam constituit. Latera in utraque parte formantur ossibus duobus obliquis et quadrangularibus, mox coalescentibus, quae processus emittunt denticulatos in centrum sterni et versus marginem testae. Ossa duo posteriora arcuata, apice dilatato ferrato conniventia, annulum claudunt, in centro membranis ac ligamentis expletum. Similiter sternum conformatum est in Cheloniarum speciebus, at ossa sunt latiora et centrum sterni officulo proprio ensiformi angustatum, quo

solidius evadit, licet desint appendices duae osseae, quibus margo sterni anticus testudinum mollium munitus est, et cartilagine atque ligamentis cum testa connectitur. Eadem fere quam in genere Cheloniarum est ossium dispositio in sterno Chelydrarum, adeo tamen sibi invicem approximata sunt, ut annulus angustissimus, centro fere clauso, appareat, et sic medium teneat inter structuram sterni Cheloniarum atque Emydum. Istae nimirum in tenera aetate similem quidem ossium dispositionem sibi vindicant ac Cheloniae, mox autem ossa increscunt in formam fere quadrangularem, et sic sternum angulatum et omnino osseum existit, ita ut pristinae partium figurae vix vestigia supersint. Omnium solidissimum autem est sternum testudinum propriae sic dictarum, licet eiusdem originis, et modo supra significato intime cum testa conjungitur.

Hisce expositis Chelonios ordine admodum naturali succedere, et recte in plura genera dividi jam liquet, id quod ex sequentibus etiam magis patebit. Optimi huius divisionis characteres a loricae structura petuntur, et sterni conformationem non solum eundem in finem, sed etiam ad Emydes subdividendas adhibuimus. Emydes nimirum, quae in rivulis vitam tegunt, sternum immobile et angulatum habent; quae autem in terra vivunt, sterno mobili et latissimo, utrinque saepius rotundato ac operculi instar testae adposito gaudent. Neque tamen alii characteres negligendi sunt, et quosnam idoneos censeamus, uberius exponendum erit. Characteres nimirum usitatissimi, in pedum conformatione quaesiti, optimi videntur, licet vitae genus exinde definiri non semper possit, ut plerumque contenditur, quod facillime de-

monstrant exempla *Cheloniae japonicae* et *Emydum sternum* mobili praeditarum. Pedes testudinum mollium palmati sunt pedibusque posterioribus *Cheloniarum* nec non digitis *Chelydrarum*, *Chelydis* et *Emydum* similes. Singularis autem est numeri unguium diversitas in *Emydis*; quem characterem adhibuimus ad species subdividendas; neque minoris momenti censemus structuram pedum in reliquis generibus distinguendis. Rarissime enim structura pedum quoad partes essentielles variabilis reperitur. *)

Caput *Cheloniorum*, *Chelyde* excepta, quae structura maxillarum et labiis ab omnibus differt, communes potius characteres quam singulares exhibet. Robustius tamen et convexius est in testudinibus terrestribus, quam in aquatilibus, ac diverso modo sub testam retrahitur. — Neque cauda notas satis idoneas praebet ad species distinguendas, longitudine tantum et apice, aut inermi aut armato, comparandus.

Contra vero integumentorum communium, quibus corpus vestitur, maior est diversitas: membranacea in omnibus partibus testudinum mollium inveniuntur coriacea et scutellorum instar divisa in capite *Cheloniarum* aliarumque, squamosa in reliquis. Scutella, quae testam obtineant, a cute duritie tantum differre patet, ceterum exemplis testudinum mollium et *Cheloniae coriaceae* haecce sententia comprobatur. — Cutis et scutella loricae, semper eo duriora sunt, quo solidior testa est, et quo frequentius animal in terra victitat. Itaque, serie a testudini-

*) v. c. testudo geometrica, pedibus palmatis, unicum huiusmodi exemplum, et *Emys punctularia* Daud. de qua infra.

bus mollibus ad terrestres continuata, scutella-loricae magis indurescere et in corpore squamarum numerum augeri observatur. Quare ab integumentis corporis characteres petere licet, nec spernendi sunt, quos distributio scutellorum offert, quoniam situ ossium, ex quibus lorica composita est, situs bractearum non determinatur. *) Tam symmetrice enim scutella disposita sunt, ut varietas, e difformitate partium orta, facile agnoscat. Rarissime tamen et non nisi in *Chelonia japonica* (et in testudinibus mollibus, si areas scutellis aequiparare velis,) distributio scutellorum testae characteres específicos praebet; in reliquis enim bracteae semper in tres lineas distributae sunt situ invariabili. Triplici autem modo scutella disposita sunt in sterno, saepius in duabus lineis parallelis sibi opposita et numero utplurimum duodecim, utrinque sena: ant inter duo anteriora scutellum impar interjectum et tunc sternum tredecim, rarius undecim, rarissime, et in *Chelydris* tantum, novem bracteis obtectum est, quem numerum, licet imparem, nunquam in eadem specie variantem vidi, nisi monstruositate ex situ partium alioquin symmetrico satis conspicua. Tertium denique et plane singularis bractearum distributionis exemplum in *Emyde longicollis* et in ista tantum videre licet, de quo postea dicetur. — Situs bractearum marginalium testae in singulis testudinibus parum differt, numerus autem admodum variat in unaquaque fere specie et vix, testudine tabulata sola excepta, de qua infra

*) *Emys Adansonii* rarissimum huiusmodi exemplum exhibet: unumquodque nimirum scutellum in latere disci costas duas obtegit.

fermo erit, unquam in definitionem recipiendus. Maiorem autem auctoritatem numero scutellorum disci tribuerim, qui tredecim bracteis ut plurimum obtectus est. Rarissimum modo praebet exemplum *Chelonia Mydas*, hunc numerum interdum in quindecim mutari, quem tamen numerum non nisi in *Chelonia Caouanna*, *Emyde cinerea*, *Testudine fasciata* et castra occurrentem in harum characteres específicos recipere non haesitavi.

Coloris denique et formae loricae ratio habenda est, licet caute notandi sint, neque adeo variant, ut confusio specierum exinde oriatur, nisi minutiora in discrimen vocentur. Ceterum quoque numerus specierum jam ita increvit, ut huiusmodi notis in tam exigua copia characterum, saepius e sola lorica petendorum, carere non possimus.

Hisce praefatis lectores argumenta, quibus ordo noster innititur, facile dijudicabunt; quare ad enumerationem specierum jam progredior.

Cap. II.

Genera et Species.

1. Conspectus.

I. *Trionyx* Geoffr.

1. *ferox* Penn.

β. *verrucosus* Bartr.

2. *aegyptiacus* Geoffr.

3. *eufraticus* Oliv.

4. javanicus mihi.
5. Brongniarti mihi.
6. grandis Schoepf.
7. subplanus Geoffr.

II. Chelonia Brongn.

α. testa corio oblecta.

1. coriacea Linn.

β. testa squamosa.

2. japonica Thunb.
3. imbricata Linn.
4. virgata Dumer. sp. n.
5. Mydas Linn.
6. Caouanna Lacep.

- | | | |
|----|---|-----------------|
| a. | } | sp. 3 fossiles. |
| b. | | |
| c. | | |

III. Chelydra mihi.

1. lacertina mihi.
2. serpentina Linn.

IV. Chelys Dumer.

1. fimbriata Schneid.
2. bispinosa Ruiz de Xelva.

V. Emys Dumer.

α. sterno immobili angulato.

1. porphyrea Daud.
2. scripta Schoepf.
3. dorsata Schoepf.
4. nasuta mihi.
5. leprosa Schoepf. sp. n.
6. cayennensis mihi.
7. gibba mihi.

8. *expansa* mihi.
9. *Dumeriliana* mihi.
10. *reticulata* Bosc.
11. *centrata* Bosc.
12. *ferrata* Daud.
13. *discolor* Thunb. sp. n.
14. *lutescens* mihi.
15. *Geoffroana* mihi.
16. *planiceps* Schneid.
17. *pulchella* Schoepf.
18. *lutaria* Linn.
 † *melanocephala* Daud.
19. *punctularia* Daud.
20. *europaea* Schneid.
21. *caspica* Gmel.
22. *picta* Herrm.
23. *cinerea* Brown.
24. *olivacea* mihi.
25. *galeata* Schoepf.
26. *subrufa* Lacep.
 † *planitia* Gmel.
27. *Adansonii* mihi.
28. *longicollis* Shaw.
29. *guttata* Schneid.
30. *Muhlenbergii* Schoepf.
31. *Spengleri* Wallb.
32. *trijuga* mihi.
33. *Herrmanni* mihi.
 p. sterno oblongo mobili.
34. *Retzii* Schoepf.
35. *scorpioidea* Lacep.

- 36. *penfylvanica* Edw.
- 37. *odorata* Bosc.
- 38. *castanea* mihi.
- 39. *amboinenfis* Riche.
- 40. *subnigra* Lacep.
- 41. *Couro* Lecchen. sp. n.
- 42. *clausa* Bloch.
- 43. *virgulata* Daud.
- 44. *Schneideri* mihi.
- † *polyphemus* Bartr.

VI. *Testudo* Brongn.

a. margine testae laterali acuto.

*) *incertae sedis.*

- 1. *cafra* le Vaillant.
- 2. *signata* Wallb.
- 3. *juvencella* Daud.

**) *testudines verae.*

- 4. *areolata* Thunb.
- 5. *fasciata* Daud.
- 6. *erosa* mihi.
- 7. *angulata* Dumer. sp. n.
- 8. *tabulata* Wallb.
- 9. *marginata* Schoepf.
- 10. *graeca* Linn.
- † *fulcata* Mill.
- 11. *denticulata* Linn.
- 12. *rotunda* Latr.
- † *elegans* Seb.
- 13. *stellata* mihi.
- 14. *geometrica* Linn.

15. radiata Shaw.

a. }
b. } sp. 2. fossiles.

β. margine testae laterali rotundato.

16. indica Voism.

β. indica Perr.

17. gigantea mihi.

2. Enumeratio systematica Cheloniorum.

§. 1.

Chelonii Brongn. Testudines Linn.

Character naturalis. Caput scutellis aut membrana laevi obtectum, plus minusve sub testam retractile aut ad lătera recondendum. Mandibulae utplurimum corneae, semper edentulae, integerrimae aut ferratae. Foramen acusticum integumentis communibus clausum. Corpus tetrapodum caudatum. Truncus latior quam altus, squamis aut corio obtectus. Vertebrae dorſi novem, subcylindricae, in media parte attenuatae arcubus dilatatis connatis. Costae octodecim, singulae ex vertebrarum duarum symphyſi nascentes, primae et anticae brevissimae, processum instar proximis aduatae, omnes dilatatae et sic inter se conjunctae, inde immobiles, respirationi non inservientes. Margo testae cartilagineus, utplurimum autem ossens et ex ossibus viginti quatuor constructus.

Sternum ligamentis aut per symphyſin teſtæ adnexum, mediante utplurimum proceſſu in utroque latere, Emydibus tamen nonnullis, ſterno mobili præditis, exceptis; ceterum viſcera pectoris et abdominis tegens.

Scapula cum pelvi intra lorica recepta. Pedes digitati, digitis diſtinctis aut corio involutis, unguiculati aut mutici. Cauda e teſta plerumque prominens. Penis unicus. Ova calcaræa. Pulli non larvati.

Obſ. Similem Cheloniorum et avium ſtructuram alio loco fuſius exponam, hic meminiffe ſufficiet, oſſa quadrata, quibus maxilla inferior cum capite connectitur, roſtrum corneum, ſternum cavitate pectoris longius, appendices coſtarum oſſeas, vertebraſ dorsi connatas lumborum vix diſtinctas et brachiorum denique ſtructuram inter comparationis momenta pertinere.

Vitæ genus et patria. Habitant ſub zona torrida et temperata in mari, fluviis, lacubus, campis, nemoribusque.

Veſcuntur aliae herbis, aliae molluſcis. Character eſſentialis. Corpus tetrapodum caudatum, coſtis in lorica connatis, cum ſterno viſcera tegentem. Maxillæ edentulæ.

§. 2.

Genus I. Trionyx Geoffr.

Char. nat. Corpus membrana, plerumque lævi, veſtitum. Caput ovale, complanatum. Maxillæ corneae, cute laxa, labiis quaſi circumſcriptae. Naſus in cylindrum membranaceum attenuatus. Collum longe protractile. Teſta humiliſſima ovata, cum ſterno cute veſtita:

discus subnudus, *) centro osseo et scabro, costis prope marginem liberis. Margo maiori ex parte membranaceus, aut cartilagineus. Sternum in singulis locis subnudum et scabrum, appendicibus duabus osseis marginis antici, ceterum formam annuli ovalis exhibens, in centro membranacei, cruribus denticulatis testam petens, ligamentisque adhaerens. Pedes palmati, digitis ut plurimum tribus unguiculatis, duobus inermibus. Cauda in plurimis brevis, vix marginem testae excedens.

Vitae genus et patria. Habitant in fluviis et lacubus regionum calidiorum, extra Europam. Vescuntur molluscis.

Char. essent. Testa centro osseo, costis versus marginem liberis. Margo lateralis utrinque coriaceus. Pedes palmati.

Spec. 1. *Trionyx ferox* Penn. *Philos. Transact.* Vol. 61. Pars I. p. 266. tab. 10.

Trunco ovato fusco, supra marginem tuberculoso, sterno sublaevi, antice testam excedente, cauda exserta.

Habitat in Carolina et Florida, frequens in fluviis Savannah et Alatomaha.

Obs. Species nondum satis cognita, e descriptione ac icone tantum nota. Caput conicum, et membrana sterni tenuissima, alba, reticulato-venosa dicitur.

Varietas huius speciei vulgo creditur et re vera esse videtur:

*) Discum testae in vivo animali cute obtegi et areas post mortem tantum in conspectum venire, certiore me fecit cel. Olivier, qui *Trionychem euphraticum* vivum observavit; idemque monet cel. Geoffroy. Quibus commotus characteres *Trionychum* potius a forma arearum majorum petii quam a numero, saepius vix conspicuo.

g. testudo verrucosa Bartr. Travels through Carolina p. 175. tab. 4. 5. maxilla cirrhosa, cirrhis retractilibus.

Habitat in Florida australi et descriptione ac icona tantum nota est. Monet ill. Geoffroy *), hancce testudinem ad genus *Chelydis* pertinere, contrarium autem edocet icon, licet rudis. Ceterum Bartram ipse observat testam, vertebrae et costis exceptis, cartilagineam ac mollem esse atque maxillam superiorem mandibulae falconis instar arcuatam et robustam. Areae vertebrales male delineatae sunt, laterales non conspicuae, sed cute obtectae, quales in vivo animali spectantur. Pedes anteriores unguibus quatuor; posteriores unguibus quinque muniti sunt in icona, quae tamen forsitan error sculptoris est, saltem in descriptione animalis de pedibus sermo non fit.

Spec. 2. *Trionyx aegyptiacus* Geoffr. Annal. du mus. d'hist. nat. XIV. p. 12. tab. 1 et 2.

Fuscus, albido adpersus, disco osseo suborbiculari, margine testae antico tuberculoso, area vertebrali prima oblonga latissima, sterno caudaque scuto brevioribus.

Descript. **) Caput globosum, fronte depressa: tubus narium truncatus brevis. Discus osseus suborbicularis, areis vertebralibus octo, lateralibus sedecim, utrinque octo, quarum posticae contiguae. Sternum albidum,

*) Annal. du mus. d'hist. nat. Tom. XIV. p. 18.

**) Taceam numerum dentium, quibus ossa sterni connectuntur et appendices osseas parallelas aut divergentes, quum pullos tantum ante oculos habuerim, et structuram harum partium aetate proveciori inutari admodum verisimile sit.

corporibus ossium lateralium et posteriorum asperis: lobus posterior retusus. Cauda crassa.

Habitat in Nilo. Vidi in museo Parisiensi specimina quatuor variae aetatis.

Spec. 3. *Trionyx euphraticus* Oliv. Voyag. en Perse. PL 453. tab. 41.

Viridi-fuscus, scuto ovali laevi, sterno brevissimo utrinque acuto, cauda tereti, loricam longe excedente.

Descr. Maxillae nudae. (?) Sternum laeve, albidum. Margo testae laevis.

Habitat in Euphrate. Vidi figuram a cel. Olivier in itinere delineatam et descriptionem, quas benivole mecum communicavit.

Spec. 4. *Trionyx javanicus* mihi. — Ann. du mus. d'hist. nat. XIV. tab. 3.

Fuscus, trunco orbiculari, margine antico superne tuberculoso, area vertebrali prima quinquangulari, marginis nulla.

Descr. Caput oblongum, tubus narium cylindricus, longe prominens. Discus ossis orbicularis, scaber, lineis elevatis irregularibus longitudinalibus. Arcae vertebrales septem, laterales utrinque octo, posticae contiguae. Margo laevis, singulis tamen tuberculis supra collum in lineam transversalem dispositis. Sternum sublaeve, lobus posticus integer. Cauda acuta, scuti marginem aequans.

Habitat in omnibus insulae Javae. Animal voracissimum, incolis sacrum sub nomine Boulouffe. Ad longitudinem pedum 2 increvit.

Vidi specimen a cel. Lechenault museo Parisiensi traditum et descriptionem, quam in itinere exaraverat, inspicendam dedit amicissimus vir.

Spec. 5. *Trionyx Brongniarti* mihi. —
Annal. du mus. d'hist. nat. XIV. tab. 4.

Fuscus, trunco ovali, area marginali antica obcordata, vertebrali prima quinquangulari.

Descr. Areae vertebrales sex, laterales utrinque septem, quarum posticae contiguae. Cauda crassa, vix exserta. (Costae posticae subliberae in specimine nostro 8 poll. longae.)

Species media inter *Trion javanicum* et *granosum*.
Patria ignota.

Obi. Speciem in manuscripto meo supra citato *Amydam Brongniarti* appellaveram, quam humanissimus vir ea, qua in me fuit benevolentia, e propria collectione describendam mecum communicaverat, posthac museo publico Parisiensi dono dedit. Ill. Geoffroy, haecce oblitus, nomen *Trionychis carinati* speciei imposuit; non haesitavi itaque quin restituam denominationem in memoriam summi viri et ipsi amicissimi.

Spec. 6. *Trionyx granosus* Schoepf. test.
p. 148. tab. 30. A. B.

Fuscus, trunco ovali, disco sternoque granoso-scabris, area marginali antica transversa, prima vertebrali oblonga latissima, cauda tereti vix exserta.

Descr. Area ovata marginis testae anticae, septem aut octo vertebrales et octo in utroque latere, quarum posticae quatuor aut sex contiguae. Areae irregulares marginem testae posticum saepius occupant. Sternum scabrum septem in locis, corporibus ossium nimirum, quibus annulus constituitur, alioquin glabrum. Cauda brevissima, apice corneo.

Habitat in India orientali. (Sonnerat.) Vidi figuram,
quam

quam dedit Schoepf. cum descriptione et specimina ejusdem auctoris Berolini in museo societatis naturae scrutatorum.

Spec. 7. *Trionyx subplanus* Geoffr. Anal. du mus. d'hist. nat. XIV. tab. 5. fig. 2.

Disco testae humilissimo orbiculari osseo, punctato scabro, area marginali antica transversa, costis maxima ex parte connatis.

Descr. Discus scaber, non lineatus. Areae vertebrales octo, quarum antica sexangularis angusta, et octo in utroque latere, non contiguae, sed omnes, interpositis areis vertebralibus, discretae.

Patria ignota.

Obs. Animal e testa tantummodo notum est et area marginali antica ossea ac scabra accedit ad *Trionychem* Brongniarti et granosum; diversum autem esse jam ambitus disci edocet, in istis semper minor, licet majores sint.

Vidi testam, qua usus est Geoffroy.

§. 3.

Genus II. *Chelonia* Brongn.

Char. nat. Corpus membrana subnuda vestitum. Caput globosum, naso in iuniori aetate in cylindrum brevem protracto. Maxillae corneae nudaе, integrae aut ferratae, apice uncinato, superior inferiorem pyxidum instar claudens. Collum breve. Testa demisso convexa, ovato-cordata, corio aut scutellis oblecta: discus in centro osseus: costae prope marginem testae lamina tenui aut cartilagine conjunctae: margo ex omni parte osseus.

Archiv für Naturwissensch. III. St.

T

Sternum annulus ossens, in centro ossenlo proprio et cartilagine clausus, bracteis corneis aut corio obtectus et cartilagine atque ligamentis testae adnexus. Pedes pinniformes, anteriores posterioribus multo longiores, unguiculati aut mutici. Cauda crassa brevis.

Vitae genus et patria. Habitant pleraeque in mari, (unica species in aqua dulci) sub zona torrida et usque ad gradum 50 latit. — Vescuntur aliae herbis (zosteria marina et algis), aliae molhuscis.

Char. essent. Margo testae ossens. Pedes pinniformes, anteriores posterioribus multo longiores.

*) Testa corio obtecta, maxilla superior versus apicem utrinque sinuata, pedes mutici.

Spec. 1. *Chelonia coriacea* Linn. syst. nat. ed. XII. 350. — Lacep. quad. ovip. tab. 2. fig. 2.

Testa oblonga, longitudinaliter profunde sulcata, sulcis supra caudam conniventibus.

Habitat in mari mediterraneo et in Oceano. Vidi specimina duo adulta pullosque duos in museo Parisiensi.

Obs. Hancce speciem genere a reliquis differre admodum verisimile est, quare doleo, occasionem scelerum examinandi nondum mihi datam esse. — Loco unguium pedes squama coriacea muniti sunt.

**) Testa squamosa, maxilla superior integra, pedes unguiculati.

Spec. 2. *Chelonia japonica* Thunb. Nov. act. succ. VIII. p. 178. tab. 7. fig. 1.

Testa subplana, excelsa carinata, carina continua, scutellorum vertebraliū triplici serie.

Descr. Spithamea, quincuplici serie scutellorum

disci. Testa nigra, ovato-subrotunda. Sternum album. Caput trigonum, vertice depresso plano.

Habitat in lacubus Iaponiae. — Vidi figuram et descriptionem, quas dedit ill. Thunberg.; proprias etiam observationes de hac specie benevole mecum communicavit.

Spec. 3. *Chelonia imbricata* Linn. syst. nat. ed. XII. p. 350. — Schoepf. test. tab. 18. A. B.

Testa elliptica, declive carinata, scutellis disci variegatis imbricatis, rostro arcuato integro.

Descr. Scutella disci tredecim, sterni duodecim. Variat unguum numerus.

Habitat in Oceano americano et asiatico.

Vidi plurima specimina.

Spec. 4. *Chelonia virgata* Dumer. in mus. Paris. — Bruce Abyss. tab. 42.

Testa ovata aut orbiculari, declive carinata, scutellis adpressis fuscis luteo-variegatis inermibus, sterno tredecim areis.

Descr. Scutella disci tredecim, marginis 24—26. Simillima in juniori aetate *Cheloniae Mydas* quoad formam testae et scutellorum: substantia bractearum autem fere eadem est ac in *Chelonia imbricata*.

Habitat in mari sub zona torrida.

Vidi specimina sex variae aetatis in museo Parisiensi.

Spec. 5. *Chelonia Mydas* Linn. syst. nat. ed. XII. p. 350. — Lacep. quadr. ovip. tab. 1. fig. 1.

Testa cordata unicolore, declive carinata, scutellis disci planis inermibus, sterno tredecim areis, maxilla inferiore profunde ferrata.

T 2

Descr. Scutella disci tredecim, rarissime quindecim. Bracteae marginales 24 — 25. Variat numerus unguium.

Habitat in mari sub zona torrida, raro in regionibus temperatis. — Vidi plurima specimina.

Spec. 6. *Chelonia Caoutanna* Lacép. quadr. ovip. — Schoepf. test. tab. 16.

Testa convexa, scutellis disci quindecim, vertebrilibus gibbosis, maxillis ferratis.

Descr. Scutella sterni duodecim. Pedes plerumque unguibus duobus armati.

Habitat in mari, frequens prope Sardiniam (Cetti) et Indiam occidentalem. (Catesby.)

Vidi plurima specimina.

Obs. Addendae species tres fossiles, de quibus strenue egit summus Cuvier (Annal. du mus. d'hist. nat. Tom. XIV. pag. 229.):

- a) *Chelonia* prope Bruxellam fossilis, quae jam in tenera aetate testam ubique ossream exhibuit. — Vidi specimen unicum Bruxellae.
- b) *Chelonia* prope Maestricht fossilis, in qua discus osseus testae multo angustior est quam in reliquis *Cheloniarum* speciebus licet maioribus.
- c) *Chelonia* prope Glaronam fossilis in monte Plattenberg, sed nondum satis cognita est.

§. 4.

Genus III. *Chelydra* mihi.

Char. nat. Corpus membrana rugosa, hinc inde squamosa obtectum. Caput trigonum. Maxillae corneae

nudae, integrae aut ferratae, apice incurvo, superior inferiorem pyxidum instar claudens. Collum longe protractile. Testa squamosa, convexa, oblonga: discus osseus: interstitia costarum prope marginem lamina tenuissima expleta: margo ex omni parte osseus. Sternum cruciforme, annulus nimirum osseus angustissimus, per symphysin et proprii ossis adjutorio testae adnexus, in centro ossiculo fere clausus, ceterum similiter conformatum quam in Cheloniarum speciebus. Pedes palmati, unguiculati. Cauda longitudinem testae subaequans, crista longitudinali munita.

Vitae genus et patria. Habitant in paludosis. Vescuntur molluscis?

Char. essent. Margo testae osseus. Sternum cruciforme, centro coriaceo. Rostrum corneum.

Spec. 1. *Chelydra lacertina* mihi.

Testa oblonga, scutellis vertebralibus planis, lateralibus carinatis, margine postico obtuse sex dentato.

Descr. Scutella disci tredecim, marginis viginti quinque, sterni novem. Digi palmarum quinque unguiculati, plantarum digitus quintus inermis. Cauda longissima, crista ferrata longitudinali.

Patria ignota. Vidi specimen in museo Parisiensi.

Spec. 2. *Chelydra serpentina* Linn. mus. Adolph. Frid. II. 36. — Schoepf. test. tab. 6.

Testa oblonga, trifariam carinato-spinosa, margine postico acute 6—8 dentato.

Descr. Scutella disci tredecim, marginis viginti quinque, sterni novem. Digi palmarum quinque un-

guiculati, plantarum digitus quintus inermis. Cauda longissima, crista longitudinali ferrata. Similis itaque praecedenti est, quae tamen characteribus supra allatis satis differt.

Habitat in aquis Americae septentrionalis (Schoepf. Bosc.), in China et Barbaria. (? Linn.) Vidi tria specimina.

§. 5.

Genus IV. *Chelys* Dumer.

Char. nat. Corpus cute verrucosa vestitum. Caput depressum. Rostrum planum latissimum, mandibulae cute obtectae. Tubus narium longissimus. Collum crassum breve. Testa oblonga squamosa (gibba: discus osseus: lamina interstitiorum costarum propè marginem tenuissima: margo ex omni parte osseus. Sternum dilatatum solidum, squamosum, testae per symphysin adhaerens. Pedes palmati unguiculati. Cauda vix exserta.

Vitae genus et patria. Habitant in paludosis regionum calidiorum. Vescuntur molluscis.

Char. essent. Testa squamosa ossea. Sternum dilatatum. Rostrum planum. Pedes palmati.

Spec. I. *Chelys fimbriata* Schneid. Schildkr. p. 349. — Schoepf. test. tab. 21.

Testa oblonga, trifariam carinato-spinosa, fronte utrinque alata, collo crasso fimbriato, sterni tredecim areis.

Descr. Scutella disci tredecim, marginis 25. Sternum obovatum, postice bifidum. Tubus narium

longissimus. Pedes palmati, digiti palmarum quinque unguiculati, plantarum digitus quintus inermis. Cauda verrucosa, teres, obtusa, scuti marginem vix excedens.

Habitat in Surinamia, in paludosis, (Bruënière. Schneider.) in Cayenna. (Richard.) — Vidi plura specimina in museo Parisiensi et Berolini.

Spec. 2. *Chelys bispinosa* Ruiz de Xelva. — Daud. rept. II. p. 94.

Testa oblonga, trifariam carinato-spinosa, fronte laevi, collo fimbriato, sterno duodecim arcis.

Habitat in Brasilia.

Obs. Species haecce e descriptione tantum nota est, nec satis accurate descripta. Scutella testae subimbricata et rugosa in definitione speciei dicuntur, marginalia in furcam supra caudam disposita, qui tamen characteres et in Chelyde fimbriata inveniuntur. Ceterum notis supra allatis satis differre videtur, nisi error adest in descriptione quam dedit Daudin. ex litt. Ruiz de Xelva de specimine $1\frac{1}{2}$ ped. longo.

†) *Chelys* spec. nov.? Geoffr. annal. du mus. d'hist. nat. XIV. pag. 19.

Scutellis lateralibus subplanis, collo unicolore. — Pullus primae aetatis, qui in museo Parisiensi servatur.

Fateor me hoc specimen quidem vidisse, nec tamen tunc temporis diversum habuisse, et quum ill. Geoffroy de eo ipse dubitet, in numerum specierum non recepi.

§. 6.

Genus V. *Emys* Dumer.

Char. nat. Corpus aut nudum, aut papillosum aut squamulis obtectum. Caput sub testam retractile, aut ad latera recondendum, squamosum aut nudum. Maxillae corneae, plerumque integrae, superior inferiorem pyxidum instar claudens. Collum ut plurimum nudum et teres. Testa squamosa, in plurimis convexa: costae undique coalitae futuris parallelis, et corpora costarum plus minusve distincta. Sternum dilatatum solidum, squamosum, uni-bi-aut trivalve, ligamentis, per symphysin aut futuris ossibus testae adnexum. Pedes digitati, palmati, rarius subliberi, unguiculati. Ungues acuti. Cauda testa brevior.

Vitae genus et patria. Habitant in paludosis, rarius in campis, pleraeque in regionibus calidioribus. — Vescuntur aliae herbis, aliae molluscis.

Char. essent. Digiti distincti. Testa squamosa ossea. Sternum dilatatum solidum. Rostrum corneum.

a) *Sterno immobili angulato.* Habitant in paludosis.

Spec. I. *Emys porphyrea* Daud. | rept. II. p. 142.

pedibus palmatis —, testa orbiculari plana, rubro-ochracea, maculis viridi-obscuris fulvisque adspersa, cauda longitudinaliter tuberculosa.

Descr. Corpus pallide cinereum, verrucosum, tuberculis quatuor squamosis ad anum. Margo testae anterior sinuatus, bracteis duabus anticis acutis. Sternum fuscum.

Habitat in nova Hollandia. (Daudin.) — Non vidi.

Spec. 2. *Emys scripta* Schoepf. test. pag. 16. tab. 3. fig. 4 5.

pedibus palmatis, plantarum digito quinto inermi, testa humili ovata, characteribus notata, cauda exserta verrucosa.

Descr. Sternum duodecim areis, antice truncatum, postice bifidum, per symphysin cum testa conjunctum. Scutella disci tredecim, marginis viginti quinque, anticum angustissimum. Caput glabrum complanatum, naso leviter protracto. Palmarum digiti quinque unguiculati.

Patria ignota.

Vidi specimen, quo usus Schoepf., in museo Parisiensi.

Spec. 3. *Emys dorsata* Schoepf. test. pag. 136. — Lacep. quadr. ovip. tab. 8. f. 2.

pedibus palmatis, plantarum digito quinto inermi, testa ovali plana, excelsè carinata, scabra.

Descr. Sternum duodecim areis, antice truncatum, postice leviter sinuatum, per symphysin cum testa conjunctum. Scutella nigro-flavoque marmorata, in iuniori aetate albida, disci tredecim, marginis viginti quinque, anticum angustissimum. Dorsum cultratum carina cristae instar profiliante. Cutis rugosa, squamis minutis. Caput glabrum, planiusculum, naso leviter protracto. Pedes pentadactyli, palmarum digiti quinque unguiculati. Cauda vix exserta.

Habitat in Surinamia. (Daudin.) — Vidi specimina

duo in museo Parisiensi, tertium communicavit cël Thunberg.

Spec. 4. *Emys nasuta* mihi.

pedibus palmatis, plantarum digito quinto inermi, testa ovali plana, scutellis rugosis, capite squamoso, tubonarium cylindrico.

Descr. Sternum tredecim areis, antice rotundatum, postice bifidum, per symphysin cum testa conjunctum. Scutella disci tredecim, marginis viginti quinque, anticum angustissimum. Palmarum digiti quinque unguiculati. Caput squamis numerosissimis munitum.

Patria ignota.

Vidi specimen unicum in museo Parisiensi.

Spec. 5. *Emys leprosa* Schoepf.

pedibus palmatis, plantarum digito quinto inermi, testa ovali humili, leviter carinata, obscure flavida, tuberculis calcareis verrucosa.

Descr. Sternum duodecim areis, antice truncatum, postice bifidum, per symphysin cum testa conjunctum. Scutella disci tredecim, marginis viginti quinque, quorum anticum ceteris minus. Caput glabrum complanatum. Collum papillosum. Pedes squamosi. Cauda longe exserta.

Patria ignota. — Vidi specimen, quod olim Hagae Comitum servabatur, in museo Parisiensi, posthac in manuscr. ineditis Schoepfii, quae b. a Schreber mecum communicavit, ejusdem figuram ac descriptionem inveni sub nomine hic adoptato.

Spec. 6. *Emys cayennensis* mihi.

pedibus palmatis, plantarum digito quinto inermi, testa

ovali convexa, scutellis dorsalibus tuberculato-carinatis, sterni corpore angusto, areis tredecim.

Descr. Sternum antice truncatum, postice bifidum, per symphysin cum testa conjunctum. Scutella disci tredecim, laevia, flavo-viridia, angulis posticis nigris. Bracteae marginales viginti quatuor, duae anticae breviores, sinum testae supra collum constituentes. Caput bracteis membranaceis obtectum, fuscum, maculis 2 luteis in vertice. Palmarum digiti quinque unguiculati. Cauda vix exserta.

Habitat in Cayenna. Vidi specimina tria, quorum unum in museo Parisiensi servatur, alterum in museo Erlangensi, tertium in proprio.

Spec. 7. Emys gibba mihi.

pedibus palmatis, plantarum digito quinto inermi, testa ovali nigerrima, humili, scutellis vertebralibus posticis tuberculato-carinatis, antico complanato declivi.

Descr. Sternum tredecim areis, antice rotundatum, postice bifidum, per symphysin cum testa conjunctum. Scutella disci tredecim, marginis viginti quatuor, anticum angustissimum longum. Caput complanatum glabrum, squamis membranaceis. Collum breve teres. Palmarum digiti quinque unguiculati. Cauda vix exserta.

Patria ignota. — Vidi specimen in museo Parisiensi.

Spec. 8. Emys expansa mihi.

pedibus palmatis, plantarum digito quinto inermi, testa depressa fusca, scutellis omnibus planis, margine latissimo horizontali, naso longitudinaliter fulcato, maxillis integris.

Descr. Sternum tredecim areis, antice rotunda-

tum, subtruncatum, postice bifidum, per symphyfin cum testa conjunctum. Scutella disci tredecim, subquadrata, marginis viginti quatuor, quorum duo antica breviora. Caput convexum, glabrum, squamis membranaceis. Collum longum, crassum. Palmarum digiti quinque unguiculati.

Habitat in America meridionali. — Vidi specimina tria in museo Parisiensi.

Spec. 9. *Emys Dumeriliana* mihi.
pedibus palmatis, plantarum digito quinto inermi, testa demissa convexa nigra, scutellis dorsalibus planis, naso convexo glaberrimo, maxilla superiore sinuato-dentata, inferiore uncinata acuta integra.

Descr. Sternum latissimum tredecim areis, per symphyfin cum testa conjunctum. Scutella disci tredecim. Bractee marginales viginti quatuor, posticae majores subhorizontales, duae anticae ceteris minores. Caput globosum, cum corpore nudum. — Similis quoad testam praecedenti, ceterum toto coelo diversa.

Habitat in America meridionali. — Dixi speciem in memoriam praeceptoris mei dilectissimi.

Spec. 10. *Emys reticulata* Bosc. Nouv. dict. d'hist. nat. Vol. 22. p. 263. c. fig.

pedibus palmatis, plantarum digito quinto inermi, testa oblonga plana fusca, lineis luteis reticulata, scutellis rugoso-radiatis, margine integerrimo.

Descr. Sternum duodecim areis, antice subtruncatum, postice sinuatum, intime cum testa connatum. Scutella disci tredecim, marginis viginti quinque, quorum anticum minimum. Caput complanatum, glabrum. Palmarum digiti quinque unguiculati.

Habitat in uliginosis Carolinae. (Bosc.) Vidi specimen cel. auctoris.

Spec. 11. *Emys centrata* Bosc. Nouv. dict. d'hist. nat. Vol. 22. p. 264. — Shaw Gen. Zool. tab. 9.

pedibus palmatis, plantarum digito quinto inermi, testa ovali subconvexa, leviter tuberculato-carinata, scutellis pallide flavis, zonis fuscis concentricis.

Descr. Sternum duodecim areis, antice truncatum, postice bifidum, per symphyfin cum testa conjunctum. Scutella disci tredecim, marginis viginti quinque, quorum anticum ceteris angustius. Palmarum digiti quinque unguiculati. Caput complanatum, glabrum. Cauda exserta. — Carina in juniore aetate continua.

Habitat in America septentrionali. Vidi specimina sex variae aetatis in mus. Parisiensi et cel. Bosc.

Spec. 12. *Emys ferrata* Daud. rept. II. p. 148. (descr. et fig. malae.) — Shaw. gen. Zool. tab. 4.

pedibus palmatis, plantarum digito quinto inermi, testa oblonga, demisse carinata, scutellis scabris rugis radiantibus, marginalibus posticis bifidis aut sinuatis.

Descr. Sternum duodecim areis, antice sinuato-truncatum, postice bifidum, futuris osseis cum testa connatum. Scutella disci tredecim, marginis viginti quinque, quorum anticum angustissimum longum. Palmarum digiti quinque unguiculati. — Testa albida aut nigro marmorata.

Habitat in America septentrionali. (Daud. ex manuscr. Boscii.) Vidi testas octo in museo Parisiensi.

*) Spec. sub. nro. 33. allata: *Emys Herrmanni*
ob similem pedum structuram praecedentibus
adjungi potest.

Spec. 13. *Emys discolor*. Thunb. in litt.
digitis distinctis unguiculatis —, testa dorso complanato,
lateribus declivis, sordide flava, fasciis variis irregula-
ribus fuscis.

Descr. Sternum tredecim areis, latissimum, an-
tice truncatum, postice bifidum, per symphylin cum
testa conjunctum. Scutella disci tredecim, vertebralia
subcarinata: marginis viginti quinque, subtus luteo va-
riegata, lateribus prope collum reflexis. Caput —

Patria ignota. Vidi figuram, quam mecum com-
municavit ill. Thunberg.

Spec. 14. *Emys lutescens* mihi.
pedibus palmatis, plantarum digito quinto inermi, testa
sordide lutea oblonga, ventricosa, in dorso complanata,
sterno fusco duodecim areis.

Descr. Sternum antice truncatum, sinuatum,
postice bifidum, per symphylin cum testa conjunctum.
Scutella disci tredecim, subquadrata, marginis viginti
quinque, anticum ceteris minus. Caput complanatum,
glaberrimum. Palmarum digiti quinque unguiculati.
Cauda brevis.

Patria ignota. Vidi specimen unicum in museo
Parisiensi.

Spec. 15. *Emys Geoffroana* mihi.
pedibus palmatis, plantarum digito quinto inermi, testa
demisse convexa nigra, scutellis dorsalibus planis, mar-
gine laterali revoluta.

Descr. Sternum tredecim areis, antice trunca-

tum, postice bifidum, per symphylin cum testa conjunctum. Scutella disci tredecim, marginis viginti quatuor, quorum anticum lineare, longissimum.

Habitat in Brasilia. Vidi specimen in museo Parisiensi, quod ill. Geoffroy Lisbonae in museo regio collegerat.

Spec. 16. *Emys planiceps* Schneid. Schrift d. Berl. Ges. naturf. Fr. IV. B. 3. St. p. 259. c. fig.

pedibus palmatis, plantarum rudimento digiti quinti nullo aut squama, testa oblonga complanata, margine laterali reflexo, scutellis dorsalibus concavis.

Descr. Sternum tredecim areis, antice truncatum, postice bifidum, cartilagine cum testa conjunctum. Scutella disci tredecim, marginis viginti quinque, quorum anticum angustissimum, ceteris paululum longius. Caput depressum, glabrum, ad latera recondendum. Palmarum digiti quinque unguiculati. Cauda exserta.

Habitat in India orientali (Schneider), Cayennae. (Martin.) — Vidi specimina duo in museo Parisiensi.

Spec. 17. *Emys pulchella* Schoepf. test. p. 113. tab. 26.

pedibus palmatis, plantarum rudimento digiti quinti inermi aut nullo, testa ovali humili, leviter carinata, scutellis pallide fuscis, versus marginem luteo radiatis, areolis circumscriptis.

Descr. Sternum duodecim areis, antice truncatum, postice obtusum, levissime sinuatum, cartilagine testae adnexum. Scutella disci tredecim, in adultis subgibba, areolis depressis. Bractee marginales viginti

quinque, quarum antica minor quadrata. Caput luteo-maculatum, planiusculum. Pedum anteriorum digiti quinque subpalmati, unguiculati. Cauda testam longe excedens.

Patria ignota. — Vidi specimina tria in museo Parisiensi.

Spec. 18. *Emys lutaria* L. syst. nat. ed. XII.

p. 352. — Lacep. quadr. ovip. tab. 3. f. 1.

pedibus palmatis, plantarum rudimento digiti quinti inermi, testa planiuscula nigricante, scutellis irregulariter sulcatis, sterno duodecim areis.

Descr. Sternum antice sinuatum, postice truncatum, retusum, per symphysin cum testa conjunctum. Scutella disci tredecim, marginis viginti quinque, quorum anticum ceteris minus. Caput nigrum, fronte complanata. Collum sparsim luteo-maculatum. Palmarum digiti quinque: exterior in nonnullis speciminibus inermis. Corpus nigrum. Cauda testam longe excedens.

Habitat in Gallia australi et ?, teste ill. Lacepede, in Silesia, India orientali et in Japonia. Vidi plura specimina et viva.

†) *Emys melanocephala* Daud. rept. II. 128. pedibus — testa castanea, sterno luteo-fusco, corpore nigro, cauda brevi.

Descr. Caput nigrum, linea lutea juxta oculos. Testa 3 poll. 9 lin. longa, 3 poll. lata. — Dubia species.

Habitat in insulis Molluccis et Philippinis. (Daud. ex litt. Vau Ernest. — Vidi descriptionem iusto brevior.

Spec.

Spec. 19. *Emys punctularia* Daud. rept.

II. 249.

pedibus subclavatis palmatis, palmarum quinque plantarum quatuor unguiculatis, testa convexa, obscura, carinata, scutellis dorsalibus mediis complanatis, ceteris declivibus, collo nigricante, maculis luteis adperso.

Descr. Sternum duodecim areis, antice sinuato-truncatum, postice subbifidum. Scutella disci tredecim, subquadrata, marginis viginti quinque, quorum anticum angustius, brevissimum. Caput glabrum, lineolis luteis ornatum. Collum longissimum. Cauda vix exserta. — Quoad pedum conformationem species haecce media est inter Emydes et Testudines, neque tamen testudinibus adnumeranda, quod male egit cel. Daudin, quum ungues acuti, collum longe protractile et caput glabrum atque depressum sit.

Habitat Cayennae. (Daudin. Richard.) Vidi specimen, quo usus Daudin, in museo Parisiensi.

Spec. 20. *Emys europaea* Schneid. Schildkr.

p. 323. — Schoepf. test. tab. I.

digitis palmatis, palmarum quinque, plantarum quatuor unguiculatis, testa planiuscula ovali fusca, luteo radiatim adpersa, areolis oblitteratis.

Descr. Sternum duodecim areis, antice rotundatum, retusum, postice truncatum subbifidum, cartilagine testae adnexum. Scutella disci tredecim, marginis viginti quinque, quorum anticum ceteris minus. Corpus nigrum, luteo adpersum. Caput fronte complanata. Digi- ti pedum anteriorum semipalmati, plantae palmatae. Cauda testam dimidiam aequans.

Habitat in Borussia (Wulff), Polonia (Bernouilli),
Archiv. für Naturwissensch. III. St. U

Italia et Sardinia (Tozzetti et Cetti), Hungaria (Marigli), rara in Gallia et? teste ill. Lacepede in America et insula adscensionis. Vidi plurima specimina.

Spec. 21. *Emys caspica* Gmel. it. russ. III. p. 59. tab. 10 et 11.

digitis palmatis, palmarum quinque, plantarum quatuor unguiculatis, testa orbiculari convexa, nigro-viridi, scutellis complanatis, capite squamato, cauda nuda.

Descr. Sternum —. Scutella disci tredecim, marginis viginti quinque, quorum anticum ceteris minus.

Habitat ad mare caspicum, in rivulis Pusahat ad urbem Schamahir. — Species nondum satis cognita. Non vidi.

Spec. 22. *Emys picta* Herrm. Schoepf. test. p. 20. tab. 4.

digitis palmatis, palmarum quinque, plantarum quatuor unguiculatis, testa oblonga, demisse convexa, scutellis laevissimis, viridi-fuscis, luteo-marginatis.

Descr. Sternum duodecim areis, longitudinem testae subaequans, utrinque truncatum, per symphyfin cum testa conjunctum. Scutella disci tredecim, fasciis irregularibus marginata. Bractee marginis viginti quinque, antica linearis, apice bifido. Caput depresso nigricans, luteo variegatum. Pedes anteriores semipalmati, plantae palmatae. Cauda testam longe excedens.

Habitat in America septentrionali. (Schoepf.) — Vidi testam in museo Parisiensi.

Spec. 23. *Emys cinerea* Brown. illustr. of Zool. p. 115, tab. 48.

pedibus palmatis, palmarum plantarumque digitis qui-

nis unguiculatis, testa orbiculari plana laevissima, scutellis cinereis, albido marginatis, disci quindecim.

Descr. Sternum duodecim areis, testa multo brevius, ligamentisque adnexum, lobis rotundatis, postico angustiore. Scutella disci fasciis rectilineis marginata: marginis viginti quatuor, quorum duo antica minora, elliptica, obliqua. Caput depressum, cinereum, nigro lineatum. Cauda exserta.

Habitat in America septentrionali. Vidi figuram pulli cum descriptione.

Spec. 24. *Emys olivacea* mihi.

pedibus — testa oblonga plana olivacea, scutellis rugosis fulcatis, vertebralibus subgibbis, marginalibus anticis quadratis rectis.

Descr. Scutella marginis testae viginti quatuor, duo antica lateralibus maiora, aequalia. Scutella disci tredecim, rugosa, rugis radiantibus, olivacea: areolae concolores, sulcis parallelis circumscriptae.

Habitat in sabulosis Nigritiae. Vidi testam sine sterno ab Adansonio collectam in museo Parisiensi.

Spec. 25. *Emys galeata* Schoepf. test. p. 12. tab. 3. fig. 1.

pedibus palmatis, palmarum plantarumque digitis quinque unguiculatis, testa oblonga plana cinerea, nigro adspersa, scutellis scabris, dorsalibus acute carinatis, sterno postice truncato.

Descr. Sternum tredecim areis. Scutella disci tredecim, punctis elevatis radiatis scabris. Bracteae marginales viginti quatuor: duae anticae quadratae minores rectae. Caput laeve, frons complanata, vertex scutello ovali clypei instar munitus.

Habitat in India orientali. (Schoepf.) Vidi specimen
cel. auct. in mus. societ. nat. scrutat. Berol.

Spec. 26. *Emys fubrufo* Lacep. quadr. ovip.
tab. II. fig. I.

pedibus palmatis, palmarum plantarumque digitis quinis
unguiculatis, testa oblonga humili unicolore, scutellis
sulcatis glabris, dorsalibus complanatis, lateralibus mar-
ginis angustissimis.

Descr. Sternum tredecim areis, antice truncatum
emarginatum, postice bifidum, intime cum testa connat-
um. Scutella disci tredecim, marginis viginti quatuor,
quorum duo antica quadrata recta. Caput depressum
glabrum.

Habitat in India orientali. (Sommerat.) Vidi speci-
men, quo usus ill. Lacepede in museo Parisiensi.

†) planitia Gmel. syst. nat.

pedibus — palmarum plantarumque digitis quinis un-
guiculatis, testa ovali convexa laevi, maxilla inferiore
uncinata, superiore longissima.

Descr. Caput ovatum, convexum, latum. Oculi
maximi. Testa squamis aequalibus et latissimis obtecta.

Habitat in Surinamia. Species admodum dubia,
a Gronovio (zoophyll. I. p. 17. n. 76. mus. ichthyol.
II. p. 86. n. 70.) descripta. Daudin [rept. II. 314.]
eandem esse credit quam *Emys punctularia*.

Spec. 27. *Emys Adansonii* mili.

pedibus — testa humili, postice latissima flava, nigro
abunde adspersa, scutellis dorsalibus mediis carinatis,
primo longissimo panduraeformi, postico triangulari.

Descr. Pulcherrima species. Scutella disci trede-

cim, marginis viginti quatuor, quorum duo antica quadrata, angulis rotundatis, recta.

Vidi testam sine sterno ab Adanfonio in Nigritia lectam.

Spec. 28. *Emys longicollis* Shaw. Zool. N.

Holland. I. p. 19. tab. 7.

digitis semipalmatis, palmarum plantarumque quaternis unguiculatis, testa oblonga plana, scutellis fuscis, sterni area antica sexangulari.

Descr. Sternum antice rotundatum, postice sinuatum, per symphyfin cum testa conjunctum et bracteis tredecim obtectum, quarum duae anticae laterales ceteris minores et triangulares, intermedia major hexagona, reliquae subquadrangulares. Scutella disci tredecim, hinc inde scabrida, primum dorsale longissimum. Bracteae marginales viginti quinque, quarum antica ceteris minor. Caput depressum glabrum. Collum longissimum.

Habitat in paludosis novae Hollandiae. (Shaw. Peron.)

Vidi vivam in horto botanico Parisiensi.

Spec. 29. *Emys guttata* Schneid. Schrift. d.

Berl. Gesellf. nat. Fr. IV. B. 3. St. p. 264. —

Shaw Gener. Zool. tab. 10.

digitis liberis, plantarum quinto inermi, testa ovali plana fusca, guttis flavis irrorata.

Descr. Sternum duodecim areis, antice truncatum, postice bifidum, per symphyfin cum testa conjunctum. Scutella disci tredecim, laevia, non areolata: marginis viginti quatuor, quorum anticum lineare. Testa versus marginem posticum dilatata, guttis saepius pallidis. Caput punctis flavis.

Habitat in humidis Americae septentrionalis. (Schoepf. Bosc.) Vidi specimina duo in museo cel. Bosc.

Spec. 30. *Emys Muhlenbergii* Schoepf. test. pag. 132. tab. 31.

pedibus — testa oblonga humili, carinata concolore, lateribus contractis, scutellis leviter fulcatis.

Descr. Sternum duodecim areis, antice rotundatum, postice bifidum. Scutella disci tredecim, fulcata, areolata, castanea: marginis viginti quinque, quorum anticum ceteris minus. Caput punctatum.

Habitat in Pennsylvania. (Muhlenberg.) Non vidi.

Spec. 31. *Emys Spengleri* Wallb. Schrift. d. Berl. Ges. nat. Fr. VI. B. p. 122 sq. tab. 3.

pedibus — testa oblonga depressa, trifariam carinata, carinis continuis, margine postico profunde serrato, dentibus acuminatis integris.

Descr. Sternum duodecim areis, antice rotundatum, postice bifidum, intime cum testa conjunctum, longitudine loricae, at multo angustius. Scutella disci tredecim, excelsae carinata: marginis viginti quinque, quorum anticum ceteris minus. Cauda longissima.

Patria ignota. — Non vidi.

Spec. 32. *Emys trijuga* mihi.

pedibus — testa convexa, ovata, fusca, tricarinata, margine flavescente integro, disco in lateribus sulco profundo circumscripto.

Descr. Sternum duodecim areis, antice truncatum postice bifidum, per symphysem cum testa conjunctum. Bractee quatuor medium sterni obtegunt. Scutella disci tredecim, punctato-areolata, marginis viginti quinque,

quorum anticum ceteris minus. Carina in commissuris scutellorum interrupta.

Vidi testam a cel. Lechenault museo Parisiensi datam et ab ipso in insula Java lectam.

Spec. 33. *Emys Herrmanni* mihi pedibus semipalmatis, plantarum digito quinto inermi, testa humili oblonga fusca tricarinata, bracteis corporis sterni quatuor.

Descr. Sternum duodecim areis, antice truncatum, postice bifidum, per symphyfin cum testa conjunctum. Scutella disci tredecim, vix areolata, bracteae marginis viginti quinque, concolores, quarum antica ceteris minor. Carinae continuae. Cauda exserta.

Vidi Argentorati specimen in museo Herrmanniano, alterum in museo Schreberi: figuram primi benevole mecum communicavit cel. Hammer.

Obs. Quoad structuram pedum haecce species primis huius generis affinis est, neque tamen iis adungere volui, usque dum conformatio pedum et in reliquis Emydibus testa tricarinata praeditis innotescat, quibus nostra simillima est. — Gmelin in Linn. syst. nat. jam descripsit speciem quandam sub nomine test. *Herrmanni*, at valde dubiam, nec ab ipso visam. Desumpsit nimirum characteres específicos e notula in Schneid. test. hist. pag. 348. quo loco observatio *Herrmanni* in speciem sibi met ipsi dubiam exponitur, quam cel. vir ill. Schneidero in litteris communicaverat.

§. *Sterno oblongo mobili.*

Testa convexa, plus minusve chnilis, costis fere oblitteratis. Sternum per symphyfin aut ligamentis testae adnexum, saepius latissimum et tunc processus laterales

nulli, ceterum bi-ant trivalve, valvulae ligamento conjunctae, antica rotundata. Digiti palmarum subliberi. Habitant in humidis aut in campis.

Spec. 34. *Emys Retzii* Schoepf. test. p. 9.
tab. 2. (fig. pulli.)

pedibus palmatis, plantarum digito quinto inermi, testa orbiculari fusca tricarinata, scutellis dorso latissimis brevibus, bracteis marginalibus subaequalibus, lobo sterni postico subtruncato.

Descr. Sternum antice mobile (?), areis duodecim: bractee duae quadrangulares mediam partem obtegunt, aliae minores processus, quibus sternum cum testa conjungitur. Scutella disci tredecim, punctato-areolata, vertebralia latiora quam longa. Carinae continuae. Bractee marginales viginti tres, antica angusta, reliquae subaequales. Palmarum digiti quinque unguiculati. Cauda vix exserta.

Patria ignota.

Obs. Vidi in museo Parisiensi testam primae aetatis. Quare de sterni nondum ossificati structura nil contendam, ceterum bivalve videbatur.

Spec. 35. *Emys scorpioidea* Lacép. quadr.
ovip. f. fig.

pedibus palmatis, plantarum digito quinto inermi, testa oblonga fusca tricarinata, scutellis vertebralibus elongatis, lateralibus marginis angustissimis.

Descr. Sternum duodecim areis, antice et postico mobile, lobis rotundatis angustis, postico retuso. Bractee duae medium sternum obtegunt, aliae minores processus laterales. Scutella disci tredecim, sublaevia, areolis oblitteratis: vertebralia longiora quam lata. Carinae

continuae. Bracteae marginis viginti tres, antica ceteris minor, laterales angustissimae, infra versus sternum dilatatae. Palmarum digiti quinque unguiculati. Cauda vix exserta, in apice ungue armata.

Habitat in Surinamia (Lacepede), Cayennae. (Richard.)
— Vidi plura specimina in museo Parisiensi.

Spec. 36. *Emys pensylvanica* Edward.
Glean. of nat. hist. II. tab. 287.

pedibus palmatis, plantarum digito quinto inermi, testa ovali fusca, scutellis dorsalibus complanatis, sterno lato utrinque mobili, undecim areis.

Descr. Sternum fere latitudinis loricae, antice rotundatum, postice sinuatum, per symphysin cum testa conjunctum. Scutella disci tredecim, vertebralia subcarinata, primum antice latissimum postice angustatum. Bracteae marginales 20 — 23, quarum antica ceteris minor. Caput luteo adpersum, complanatum, ore acuto. Palmarum digiti quinque unguiculati. Cauda in apice ungue armata.

Habitat in America septentrionali. Vidi plura specimina in museo cel. Bosc.

β. var. sterno immobili Schoepf. test. p. 110. tab. 24. fig. B. — An specie aut sexu diversa?

Vidi specimen cel. auctoris in museo societ. natur. scrutat. Berol. E. pensylvanicae alioquin simillimum.

Spec. 37. *Emys odorata* Bosc. Nouv. dict. d'hist. nat. Vol. 22. p. 267.

pedibus palmatis, plantarum digito quinto inermi, testa ovali, nigro-fusca, scutellis dorsalibus carinatis, sterno angustissimo, antice mobili, undecim areis.

Descr. Sternum antice rotundatum, postice bifi-

dum, per symphyfin cum testa conjunctum. Scutella disci tredecim: primum dorsale angustum longissimum. Bracteae marginales 20 — 23, quarum antica minor. Caput lineis luteis ornatum, ore obtuso. Palmarum digiti quinque unguiculati. Cauda in apice unguiculata. — Vivum animal molchum olet.

Habitat in America septentrionali. (Bosc.) Vidi plura specimina in museo cel. Bosc., adeo tamen E. pennsylvanicae similia, ut vix aut sexu tantum differre crederem, nisi ill. vir viva studiose observasset.

Spec. 38. *Emys castanea* mili.
pedibus — testa ovali, castanea, convexa, rugis levissimis radiantibus, scutellis vertebralibus mediis carinatis, areolis punctato-rugosis nigris.

Descr. Sternum tredecim areis, lobo antico rotundato, mobili, postico angustiore bifido, cum testa intime conjunctum. Scutella disci tredecim, sublaevia. Bracteae marginales viginti quatuor, {duae anticae minores, quadratae, rectae.

Patria ignota. Vidi testam, quae in museo Parisiensi servatur, sub nomine falso test. subnigra β . rept. II. 198. a Daudin descriptam.

Spec. 39. *Emys amboinensis* Riche. Daud.
rept. II. 309.

digitis palmatis unguiculatis, palmarum quinque, plantarum quatuor, testa convexa fusca laevi, scutellis marginalibus recurvis, luteo adspersis.

Descr. Sternum duodecim areis, ovale, magnum, antice et postice mobile, ligamentis cum testa conjunctum. Scutella disci tredecim, marginis viginti quatuor.

Habitat in Amboina. (Daudin ex litt. Riche.) — Non vidi.

Spec. 40. *Emys subnigra* Lacep. quadr. ovip.

p. 213. tab. 7. fig. 2.

pedibus palmatis, plantarum digito quinto inermi*), testa ovali, convexa, nigra, scutellis nitentibus, in margine striatis, vertebralibus mediis planis, leviter carinatis.

Descr. Sternum tredecim areis, antice mobile, rotundatum, postice bifidum, intime cum testa conjunctum. Scutella disci tredecim, laevia, adspectu pingui, non areolata. Bracteae marginales viginti quatuor, duae anticae minores rectae, laterales angustissimae,

Patria ignota. Vidi testam, qua usus cel. Lacepede.

Spec. 41. *Emys Couro* Lechenault.

digitis palmatis, plantarum digito quinto inermi, testa subglobosa, subtricarinata, nigricante, sterno integro latissimo, maculis nebulosis variegato.

Descr. Sternum antice mobile, utrinque rotundatum, duodecim areis ligamentis testae adnexum. Scutella disci tredecim: dorsalia complanata, subcarinata, lateralia convexa subcarinata. Bracteae marginales viginti quinque, quarum antica linearis. Digiti palmarum quinque unguiculati.

Vidi testam a cel. Lechenault in Java collectam et sub nomine test. Couro museo Parisiensi traditam.

Spec. 42. *Emys clausa* Bloch. Schrift. Berl.

Ges. nat. Fr. VII. B. I. St. p. 131. tab. I. fig. 1. 2.

digitis subpalmatis, unguiculatis, palmarum, quinque, plantarum quatuor, testa fusca, luteo marmorata, excelsè carinata, scutellis rectilineis, areolis oblitteratis excentricis.

*) Fide Dandin.

Descr. Sternum duodecim areis, antice mobile, utrinque rotundatum, ligamentis testae adnexum. Scutella disci tredecim laevia, areolis concoloribus: dorsalia planiuscula. Carina excelsa lata, complanata, ut plurimum continua. Bractee marginis viginti quinque, quarum antica in plerisque linearis. Cauda brevissima. — Testa convexa aut planiuscula, margine postico verticali aut horizontali.

Habitat in campis et collibus Americae septentrionalis. (Bloch. Bosc.) Vidi specimina tria in museo Parisiensi et cel. Bosc.

Spec. 43. *Emys virgulata* Daudin. rept. II. 201. tab. 23.

digitis subliberis unguiculatis, palmarum quinque, plantarum quatuor, testa convexa nigra, subcarinata, scutellis curvilineis, guttis fasciisque luteis irregularibus variegatis, marginalibus recurvis.

Descr. Sternum duodecim areis, antice mobile, utrinque rotundatum, ligamentis testae adnexum. Scutella disci tredecim, areolis oblitteratis excentricis, dorsalia complanata. Carina ut plurimum interrupta humilis, versus marginem testae posteriorem incrassata. Bractee marginales viginti quinque, antica angustior. Cauda vix exserta.

Variat numerus scutellorum marginalium, et convexitas testae. Carina in nonnullis vix ulla, in aliis fere continua. Margo plerumque revolutus, rarius horizontalis.

Habitat in humidis Carolinae. (Daudin. Bosc.) Vidi plura specimina in museo Parisiensi et cel. Bosc.

Spec. 44. *Emys Schneideri* mihi.

digitis —, testa sulphurea, excelsa carinata, scutellis rectilineis, maculis castaneis marginatis, areolis centralibus, fuscis, circumscriptis.

Descr. Sternum duodecim areis, utrinque rotundatum, postice subtruncatum. Scutella disci tredecim, laevia, dorsalia complanata. Carina excelsa plana continua. Bracteae marginis 25—27, antica minor.

Patria ignota. — Vidi specimina duo, quorum unum in museo Parisiensi, alterum Argentorati in museo Hermanniano. Speciem dixi in memoriam cel. Schneider, de historia testudinum meritissimi.

†) *Emys polyphemus* Bartr. Trav. trough Carol. p. 18.

pedibus subclavatis (?), plantarum digito quinto inermi, corpore cum testa cinereo.

Descr. Species dubia, male descripta. Sternum mobile, antice rotundatum, retusum, postice bifidum. Corpus squamosum. Maxilla superior incurva. Ungues robusti, acuti, palmarum quinque, plantarum quatuor, digito quinto inermi. — Testa 18 poll. longa, 10—12 lata.

Habitat in Florida. — Non vidi.

§. 7.

Genus VI. *Testudo* Brongn.

Char. natur. Caput globosum, squamosum. Maxillae corneae, in plurimis serratae, superior inferiorem pyxidum instar claudens. Collum crassum, verrucosum, parum protractile. Testa squamosa solidissima, ut plurimum globosa, costae plerumque oblitteratae, in juniore

aetate futuris irregularibus conjunctae. Areolae in plerisque distinctae et regulares. Sternum solidissimum, latum, per symphysin aut futuris ossibus testae adnexum. Pedes squamosi, clavati, digitis integumento communi conjunctis. Ungues recti obtusi. Cauda crassa, in plurimis vix exserta.

Vitae genus et patria. Habitant tardigradae in campis et nemoribus regionum calidiorum, rariores in frigidis. Sub terra occultae hibernant. Vescuntur molluscis et radicibus.

Char. essent. Pedes clavati. Sternum dilatatum, solidissimum. Rostrum corneum.

α. margine testae laterali prominente, acuto.

*) Incertae sedis.

Obf. Ob areolas similiter quam in testudinibus configuratas species sequentes, tanquam terrestres descriptas, sed e lorica tantum notas, hic distribuimus, licet testa humilissima Emydibus affines. Ceterum quoque officatio testae in illis summa et costae evanidae uti in testudinibus proprio sic dictis.

Spec. I. Testudo castra le Vaillant. — Daud. rept. II. 291.

testa complanata lutescente, scutellis disci quindecim, nigro marginatis punctisque nigris variegatis, areolis concoloribus planis.

Descr. Scutella disci complanata: vertebrale quintum gibbosum, laterales anticae minimae. Areolae in centro levissime protractae. Bracteen marginales viginti sex: antica brevissima, angusta, retusa. Sternum antice —, postice bisidum. Margo testae anterior et posterior leviter ferratus.

Habitat in Africa. (Daudin ex manuscr. le Vail-
lant.) — Vidi testam a cel. viro in museo Parisiensi de-
positam.

Spec. 2. Testudo signata Wallbaum. che-
lon. p. 71 et 120. c. fig.

testa humili flavicante, scutellis disci tredecim planiuscu-
lis, lineolis punctisque nigris adumbratis, areolis nigri-
cantibus depressis.

Descr. Bracteae disci concolores, fascia nulla, com-
missurae sulco levi exaratae. Bracteae marginis viginti
sex, antica angustissima retusa. Sternum duodecim areis,
antice truncatum, postice bifidum. Similis sequenti.

Varietates. 1) testa flava, punctis numerosissimis
adpersa, margine utrinque profunde dentato.

2) testa gilvo grisea, punctis et dentibus rarioribus.

Patria ignota. Vidi testas duas in museo Parisiensi.

Spec. 3. Testudo juvencella Daud. rept.
VIII. p. 548.

testa demisse convexa, lutescente, scutellis disci tredecim
globosis, nigro marginatis lineolisque nigris variegatis,
areolis nigricantibus depressis, commissuris bractearum
profundis.

Descr. Bracteae marginis viginti sex. Areolae cen-
trales punctatae. Sternum antice —, postice bifidum.
Testa in lateribus contracta, in margine postico dentata.
Dentes similiter quam in praecedentibus scutellorum
commissuris excisis formantur. — Vidi testas duas:

a. areolis in centro gibbis, lineis nigris radiantibus,
in margine scutellorum parum confluentibus: bractea
marginali antica lineari simplici. — Specimen cel.
Daud. quod in museo Parisiensi servatur.

β. scutellis vix depressis, commissuris nigerrimis: bracteis duabus anticis linearibus. — Testa e museo cel. Richard.

**** Testudines verae.**

Spec. 4. *Testudo areolata* Thunb. Nov. act. suec. VIII. p. 180. c. fig. — Schoepf. test. tab. 23.

testa oblonga convexa, lutescente, scutellis elevatis, commissuris profunde exaratis, areolis fulvis subdepressis.

Descr. Scutella disci tredecim, marginis viginti quatuor, quorum anticum angustissimum. Areolae centrales punctatae, in centro gibbae. Sternum duodecim areis, antice truncatum, postice bifidum. Caput squamis minutissimis obtectum. Maxillae uncinatae, serrulatae. Collum breve papillosum. Pedes squamati, palmarum plantarumque unguibus quatuor. Cauda exserta.

Patria. Vidi specimina quatuor a cel. Bosc. et Richard in Carolina et Cayenna lecta. — Habitat quoque in Brasilia (Seba) et in India orientali. (? Thunberg.)

Spec. 5. *Testudo fasciata* Daud. rept. II. 294. testa fusco-badia, scutellis disci quindecim, omnibus complanatis, areolis depressis planis, antice albo marginatis.

Descr. Scutellum vertebrale primum leviter carinatum, quintum planum: laterales anticae disci minimae. Scutella marginis viginti septem, quorum anticum angustissimum. Commissurae bractearum in margine antico et postico dentium instar contractae. Corpus squamis minutissimis munitum. Ungues palmarum quinque, plantarum quatuor. Cauda brevissima.

Habitat in Ceylonia. (Daudin ex litt. Van-Ernest.) — Non vidi.

Spec.

Spec. 6. *Testudo erosa* mihi.

testa oblonga fusca, scutellis disci rectilineis fulcatis, bracteis marginalibus in dentem protractis, eroso-feratum.

Descr. Scutella disci tredecim, marginis viginti duo, subaequalia. Margo anterior supra collum leviter protractus, erosus, profunde sinuatus. Areolae scutellorum dorsaliū regulares, lineis circumscriptae, leviter carinatae. Sternum antice bifidum, lobis alaeformibus et testa longius, postice rotundatum sinuatum, ceterum latissimum, areis duodecim.

Habitat in America septentrionali. (Shaw.) Vidi specimina duo in museo Manheimensi; figuram et descriptionem huius speciei iam dedit cel. Shaw. (Gener. Zool. III. p. 59. tab. 13.) sub nomine falso test. denticulatae Linn.

Spec. 7. *Testudo angulata* Dumer. in mus. parif.

testa oblonga ventricosa nigra, supra collum triangulariter excisa, scutellis disci rectilineis fulcatis, areolis flavis depressis, bractea marginali antica angustissima.

Descr. Scutella disci tredecim, complanata: marginis viginti quatuor flava, macula nigra triangulari notata, posticum subgibbum. Angulus sinus testae antici acutus. Sternum undecim areis, antice angustissimum truncatum, postice bifidum. Cauda exserta. Ungues palmarum quique, plantarum quatuor. — Areolae in centro leviter protractae, lineis elevatis circumscriptae.

Patria ignota. — Vidi specimina duo in museo Parisiensi.

Spéc. 8. *Testudo tabulata* Wallbaum chelon. p. 78 et 122. — Schoepf. test. tab. 12. f. 2. et tab. 13.

testa oblonga ventricosa, nigro-castanea, antice sinuata; scutellis disci rectilineis sulcatis, areolis flavis subgibbis, bracteis marginalibus subaequalibus.

Descr. Scutella disci tredecim, marginis vigintitria, quorum duo antica ceteris paululum breviora, inter se aequalia, posticum gibbum: Margo testae unicolor. Sternum duodecim areis, antice truncatum emarginatum, postice bifidum. Cauda exserta. Ungues palmarum quinque, plantarum quatuor.

Habitat in America meridionali. (Seba. Gmelin.) in Africa australi. (Thunberg. Schoepf.)

Obs. Numerus bractearum marginalium admodum constans est; semper eundem observaverunt Wallbaum, Schoepf, neque in octo speciminibus musei Parisiensis aliisque variantem vidi.

Specie forsitan differunt:

β. *cayennensis*. (Test. tabulatae pullus Schoepf. test. p. 62. tab. 14.)

areolis ultra dimidiam bractearum partem latis, sulcis rarioribus circumscriptis, scutellis marginalibus posticis decrescentibus verticalibus, anticis supra collum profunde sinuatis. — Vidi specimina tria in museo cel. Richard, ab ipso in Cayennâ lecta.

γ. *africana*.

scutellis disci quindecim subgibbis, irregularibus: bracteis marginalibus in dentes rotundatos protractis, areis sterni undecim.

Vidi testam unicam in museo Parisiensis, forsitan monstruosam.

Spec. 9. *Testudo marginata* Schoepf. test.
p. 52. tab. 11 et 12. f. 1.

testa oblonga ventricosa nigricante, areolis sulphureis protractis, margine testae postico explanato, horizontali.

Descr. Scutella disci tredecim, nonnihil luteo marmorata: marginis viginti quatuor, quorum anticum angustius. Sternum duodecim areis, antice emarginatum, postice bifidum. Cauda vix exserta. Ungues palmarum quinque, plantarum quatuor.

Habitat in America meridionali. (Schoepf.) Vidi plurima specimina.

Spec. 10. *Testudo graeca* Linn. syst. nat. ed. XII. p. 252. — Schoepf. test. tab. 8 et 9. testa globosa, nigro flavoque varia, scutellis subgibbis curvilineis, marginali postico hamato, obtuso.

Descr. Scutella disci tredecim, marginis viginti quinque, quorum anticum angustius. Sternum duodecim areis, antice retusum, postice bifidum. Ungues palmarum quatuor aut quinque, quintus tamen brevis, adpressus, plantarum quatuor.

Habitat in Europa meridionali et (?) in America. (Seba.) — Vidi plurima specimina.

†) *Testudo sulcata* Mill. on var. subj. tab. 26. A. B. C.

testa oblonga ventricosa, scutellis gibbis, sterno utrinque sinuato, lobis alaeformibus, femoribus calcaratis.

Obs. *Testudo* ex icone tantum nota est, sed specie a reliquis differre videtur. Sternum ex duodecim areis constat, quarum anticae duae alaeformes, angustissimae ac divergentes: posticae similiter conformatae, at latiores. Squamae duae longissimae, calcaris instar,

femoribus incubant. Ungues palmarum quinque, plantarum quatuor. Corpus squamosum. Noli hancce testudinem in numerum specierum recipere, quum descriptio ad naturam facta nullibi existit.

Vidi figuram in Schneid. Samml. zool. Abhandl. et Bechst. Naturg. d. Amph. v. Lacep.

Habitat in insulis Americae merid. (Miller.)

Spec. 11. Testudo denticulata Linn. syst.

nat. nro. 9. — Schoepf. test. tab. 28. fig. 1.

testa globosa pallida, scutellis verrucosis rectilineis, bracteis marginalibus crenatis.

Descr. Scutella disci tredecim, areolis nullis, marginis 21—23, quorum duo antica subaequalia, ceteris paululum breviora. Margo anterior supra collum eroso-sinuatus. Sternum duodecim areis, antice truncatum, emarginatum, postice retusum. Palmarum ungues quinque, plantarum quatuor. Cauda crassa, vix exserta, in apice ungue armata.

Habitat in Virginia (Linn.) ad fretum Hudsoni (? Miller). — Vidi specimina duo in museo Parisiensi.

Spec. 12. Testudo rotunda Latr. rept. I.

107. II. 282. — Lacep. quad. ovip. tab. 3. fig. 2.

testa globosa, pallide flava, punctis filaceis adspersa, cauda crassa vix exserta.

Descr. Scutella disci tredecim, marginis viginti tria, subaequalia, duo antica paululum breviora. Margo integer. Sternum duodecim areis, antice truncatum, postice bifidum. Ungues palmarum quinque, plantarum quatuor.

Patria ignota. — Vidi pullos duos, quibus usus cel. Latreille, in museo Parisiensi, jam ab ill. Lacepede

descriptos sub falso nomine test. orbicularis, in Europa meridionali et in Borussia indigenae.

†) Testudo elegans Seb. thes. tab. 79. fig. 3.
testa globosa flava, commissuris scutellorum macula ovata nigra notatis.

Descr. Scutella disci tredecim, marginis —, aequalia. Sternum —. Ungues palmarum quinque, plantarum quatuor.

Habitat in Ceylonia. (Seba.) Species ex icone tantum nota, quae rudis.

Spec. 13. Testudo stellata mihi. — Schoepf. test. tab. 25.

testa globosa, scutellis spadicis, areolis convexis, macula stellata lutea notatis.

Descr. Scutella plus minusve sulcata, disci tredecim, marginis viginti tria, aequalia, posticum ceteris latius. Sternum duodecim areis, antice truncatum, crenatum, postice bifidum. Margo testae in juniori aetate crenulatus. Cauda exserta. Ungues palmarum quinque, plantarum quatuor.

Habitat in India orientali. (Schoepf. sub falso nomine: test. elegans Seb.) — Vidi plura specimina et in museo nat. scrutat. Berol. specimen Schoepfi.

Spec. 14. Testudo geometrica Linn. syst. nat. ed. XII. 353. — Schoepf. test. tab. 10.

testa globosa nigra, scutellis gibbis, truncatis, flavo radiatis, areolis flavis subdepressis.

Descr. Scutella disci tredecim, marginis viginti quatuor, quorum anticis bractea minima supra collum saepius interjecta est: posticum hamatum, acutum. Sternum duodecim areis, antice sinuato-truncatum, postice bifidum.

Habitat ad Cap. b. sp. (Thunberg.) in Asia et Madagascar et in insula adscensionis (Lacepede); in Brasilia (Marcgraf); in India orientali. (Piso.) — Vidi plurima specimina variae aetatis.

Obs. In manuscripto inedito Schloepf. de specimine rarissimo mus. Bloch. loquitur, quod pedes palmatos exhibuit. Talem jam depinxit testudinem geometricam Piso (hist. nat. Ind. III. p. 105. fig. 1.) et hinc derivandae auctorum nonnullorum descriptiones, quibus speciebus aquatilibus adnumeratur.

Spec. 15. Testudo radiata Shaw gen. Zool.

III. p. 22. tab. 2.

testa hemisphaerica nigra, scutellis planis, flavo radiatis, areolis rufis.

Deser. Scutella disci tredecim, marginis vigintitria, quorum anticum ceteris minus, posticum fornicatum. Sternum duodecim areis, antice angustum, sinuato-truncatum, postice bifidum.

Habitat in insula Madagascar. (Shaw. Commerçon.) — Vidi testas duas in museo Parisiensi.

*) Accedunt species duae fossiles:

a) testudo prope Aix fossilis, nondum satis explorata. — Cfr. Cuvier annal. du mus. d'hist. nat. Tom. XIV. p. 241.

b) testudo prope Parisios fossilis, ab ill. Cuvier descripta. Annal. du mus. d'hist. nat.

β. margine testae laterali rotundato, lorica cylindracea.

Spec. 16. Testudo indica Vosmaer.

testa cylindrica, supra collum reflexa, margine postico complanato horizontali, sterni areis undecim.

Descr. Scutella disci tredecim, duo lateralia antica convexa. Bracteae marginis viginti tres, subaequales. Sternum antice rotundatum angustum, postice retusum. Caput squamosum, maxillae serratae. Collum crassum, parum protractile. Ungues palmarum quinque, plantarum quatuor. Cauda crassa, vix exserta.

*) margine scutellorum sulcato.

Testudo indica Vosmaer. — Schoepf. hist. test. p. 101. tab. 22. fig. B.

Habitat ad Cap. b. sp. (? Schoepf.) Vidi specimina quinque in museo Parisiensi.

**) margine scutellorum laevi, bracteis disci anticis in centro tuberculosis.

Testudo indica Perrault. memoir. de l'acad. des scienc. Tom. III. Pars 2. p. 177. c. fig. mala.

Habitat in India orientali. (Perrault.) — Non vidi.

Spec. 17. *Testudo gigantea* mihi.

testa cylindracea, supra collum complanata, scutellis laevibus, postico marginali cum vertebrali quinto gibbosis, sterno duodecim areis.

Descr. Scutella disci tredecim, marginis viginti tres, aequales. Sternum utrinque angustatum. Caput crassum squamosum, maxillis serrulatis. Collum crassum. Pedes squamis robustis, latissimis muniti, unguibus palmarum quinque, plantarum quatuor. Cauda crassa, non exserta.

Habitat in Brasilia. — Vidi animal e collectione regia Libonensi proventum in museo Parisiensi.

Caput III.

Specierum novarum et quarundam imperfecte cognitarum accuratior descriptio.

§ I.

Spec. 2. *Trionyx aegyptiacus* Geoffr.

Uberius exponenda nobis erit historia speciminum huius *Trionychis*, quae in museo Parisiensi servantur, quum de iis plane alienam sententiam foveamus, quam cel. Geoffroy. Examinavimus nimirum exemplaria quatuor:

1. testam *Trionychis aegyptiaci*, adulti, ab ill. Geoffroy ex Aegypto allatam, rugosam, lineis nonnullis asperis longitudinalibus insignem, ceterum ita conformatam ut capite antecedenti expositum est.

Mensio disci ossei, pede Parisiensi instituta, (nam de margine dilacerato taceam,) sequentem partium proportionem exhibuit:

Longitudo 1 p. 1 poll. 2 lin.

Latitudo 1 p.

Altitudo - - 4 poll. 1 lin.

2. Pullus in spiritu vini conservatus, sub nomine testudinis cartilagineae a Boddaerto descriptus, ejusque auctoris specimen, olim Hagae Comitum assertum, sequentes notas praebet:

Area vertebralis antica transversalis. Discus ossis angustissimus, oblongus, cute obtectus, et inde nomen arearum vix conspicuus. Tubercula marginem scuti anticum occupant, in lineam transversam disposita et huiusmodi lineae continuae aut interruptae omnem superficiem testae tegunt, duae parallelae supra vertebrae carinam spuriam constituunt. Testa pallide fusca maculis albidis et obscurioribus abunde adpersa est, quae maculae singulis in locis in formam stellularum coeunt, et huiusmodi stellulae magis conspicuae sunt versus marginem testae posticum. (Ill. Geoffroy exinde characterem specificum *Trionychis stellati* petiit.) — Sternum laeve, album, appendicibus ossibus anticis approximatis, paululum divergentibus. Caput cum collo pedibusque cute laevi vestitum, quae pallide fusca, maculis creberrimis albidis. Tubus narium cylindricus truncatus. Maxillae integrae, cute laxa circumcinctae. Pedes palmati, pentadactyli, digiti tres exteriores unguiculati. Cauda crassa, testae margine brevior. — E quam terra pullus provenit, ignotum est.

Mensurae *).

Longitudo animalis collo protracto	5 poll.	2 lin.
Longitudo capitis - - - - -	1 poll.	2 lin.
Longitudo colli protracti - - - - -	1 poll.	—
Longitudo scuti - - - - -	3 poll.	—

*) Mensuras eum in finem addimus, ut a comparatione mensurarum testudinum variae aetatis modus quoque incrementi partim magis in posterum innoteat. Sic v. c. in testudinibus proprie sic dictis altitudinem cum latitudine testae per singulos annos alia ratione progredi quam in *Emydibus*, quae humiliores sunt, scutellisque planis, jam in proœmio breviter monuimus.

Longitudo disci ossei	- - - -	1 poll.	10 lin.
Longitudo annuli sternalis	- - - -	1 poll.	7 lin.
Longitudo caudae	- - - -	—	5 lin.
Latitudo testae	- - - -	2 poll.	7 lin.
Latitudo disci ossei	- - - -	—	7 lin.
Latitudo capitis summa	- - - -	—	7 lin.
Latitudo annuli sternalis	- - - -	1 poll.	1 lin.
Altitudo testae	- - - -	—	9 lin.

Mensura huius speciminis a Boddaerto jam sumta, (epistola de testudine cartilaginea. Amstel. 1770. p. 21.) a nostra nonnihil differt, id quod pedis, quem adhibuimus, diversitati tribuendum videtur.

3. Pullus alter in spiritu vini asservatus ab antecedenti prorsus non differt, nisi quod stellulae rariores sint, et in disco tantum conspiciantur. Areae vertebralis anticae structura difficillima exploratu est ob tenerrimam aetatem animalis, nec tamen diversae formae videtur, quam in *Trionychae aegyptiaco*. An vero pullus ex Aegypto allatus sit, ignoratur.

Mensurae.

Longitudo animalis collo protracto	3 poll.	11 lin.
Longitudo capitis	- - - -	— 11 lin.
Longitudo colli protracti	- - - -	1 poll. —
Longitudo testae	- - - -	2 poll. —
Longitudo caudae	- - - -	— 6 lin.
Longitudo annuli sternalis	- - - -	1 poll. 3 lin.
Latitudo testae	- - - -	1 poll. 10 lin.
Latitudo capitis	- - - -	— 6 lin.
Latitudo annuli sternalis	- - - -	— 10 lin.
Altitudo testae	- - - -	— 6 lin.

4. Pullus in spiritu vini asservatus, ab ill. Geoffroy ex Aegypto allatus antecedentibus minor est, et notis sequentibus ab illis (Trion. stellato Geoffr.) differt:

a) margine scuti supra collum vix tuberculoso. Tubercula marginis magis conspicua prope pedes anteriores.

b) linea simplici tuberculosa, carinae instar vertebrae tegente. In aliis lineam duplicem esse monet ill. Geoffr. (annual. du mus. d'hist. nat. XIV. p. 12.)

c) stellulis non distinctis.

d) appendicibus sterni anterioribus paululum rectioribus quam in nro. 2, at os semilunare, quo connectuntur, nondum perfecte formatum videtur.

Quae existunt differentiae inter Nro. 2 et 4. vix specificae nobis videntur, neque sententiam cel. Geoffroy hac in re adoptamus. Candidè exposuimus observationes nostras, judicent lectores.

Mensurae.

Longitudo animalis collo protracto	3 poll.	1 lin.
Longitudo capitis	—	7 lin.
Longitudo colli protracti	—	6 lin.
Longitudo testae	2 poll.	—
Longitudo caudae	—	4 lin.
Longitudo annuli sternalis	1 poll.	1 lin.
Latitudo testae	1 poll.	11 lin.
Latitudo capitis	—	4 lin.
Latitudo annuli sternalis	—	10 lin.
Altitudo testae	—	5 lin.

§. 2.

Spec. 5. *Trionyx Brongniarti*.

Caput, trigonum, fronte complanata. Oculi sat magni, approximati. Rostrum obtusum, maxillis integerrimis, cute laxa circumcinctis. Tubus narium elongatus. Collum rugosum, in longitudinem quartae partis testae protractile. Scutum ovale, margine antico linea papillosa munito, postico cum lateribus laevi. Discus osseus oblongus, rugoso-reticulatus, vix scaber et lamina tenuissima, cornea fere, obtectus ceterum angustus, dimidiam partem costarum tantummodo connectens: costae duae posticae angustissimae non, nisi ad vertebrae, cum disco conjunctae, ceterum liberae. Areae vertebrales sex carinam humilissimam constituunt, postice latitudine decrescentes: prima quinquangularis, angulo antico acuto: secunda, tertia, quarta et quinta oblongae, quadrangulares, rectilineae, sexta irregularis, angustissima. Areae oblongae, septem in utroque latere disci: duae posticae immediatim conjunctae, reliquae, interpositis areis vertebralibus discretae. Area accessoria inter primam vertebralem et marginem scuti anteriorem obcordata et quinquangularis est, angulo postico acuto. Sternum glabrum, corpora ossium lateralium et posteriorum rugoso-reticulata, vix scabra. Crura lateralia, quae testam petunt, longitudine aequalia sunt, at postica bifida. Cauda crassa, acuta, marginem scuti subaequans. Pedes palmati, digitis quinque, duobus muticis, membrana larga, ultra tarsum ascendente unitis.

Longe haesitavimus, an hic *Trionyx* specie differat, veriti nimirum, ne differentiae, quae nunc existunt,

aetate proVectiori dispereant. Discrepat autem a similibus :

α. a *Trionyche javanico*.

1. disco oblongo angusto costarum dimidiam partem vix tegente. Specimen *Trionychis javanici* parum maius, quod comparavimus, discum multo latiorrem habet.
2. arēis vertebralibus sex, lateralibus utrinque septem.
3. costa postica sublibera.
4. area obcordata in margine scuti anteriori.
5. capite angustiore, longiore.
6. collo brevior.

β. a *Trionyche granoso*.

1. disco osseo angustiore, vix scabro.
2. numero arearum.
3. costa postica sublibera.
4. arēa vertebrali prima quinquangulari, nec oblonga, nec dilatata.
5. area obcordata, quinquangulari marginis scuti antici.
6. margine scuti anteriore papilloso, (posteriore laevi.)
7. sterno sublaevi, corporibus ossium sterni nec rotundatis nec granoso-scabris.
- (8. collo brevior et cauda longior.)

Mensurae.

Longitudo totius corporis	- -	8 poll.	1 lin.
Longitudo scuti	- - - -	5 poll.	6 lin.
Longitudo disci	- - - -	2 poll.	9 lin.
Longitudo marginis scuti anterioris	—	10 lin.	
Longitudo marginis scuti posterioris	1 poll.	11 lin.	
Longitudo colli protracti	- -	1 poll.	1 lin.
Longitudo capitis in crista occipitati	1 poll.	6 lin.	

Longitudo scuti inferioris	- -	4 poll.	2 lin.
Longitudo annuli sternalis	- -	3 poll.	5 lin.
Longitudo caudae	- - - -	1 poll.	4 lin.
Latitudo scuti in vertebra quarta		5 poll.	—
Latitudo disci in vertebra quarta		1 poll.	9 lin.
Latitudo capitis	- - - - -	—	10 $\frac{1}{2}$ lin.
Latitudo loricae inferioris summa		5 poll.	—
Latitudo annuli sternalis summa		3 poll.	5 lin.
Altitudo scuti cum sterno	- -	1 poll.	6 lin.

§. 3.

Sp. 4. *Chelonia virgata* Dumer.

Animal in juniore aetate quoad formam corporis *Cheloniae Mydas* simillimum esse, attamen substantia scutellorum longe differre, jam supra expositum est. Aetate proveciori testa in formam fere orbicularem abit, qualem in *Chelonia Caouana* observavit Schoepf. (test. pag. 71. tab. 16. B.) De huiusmodi lorica hic sermo erit.

Scutella disci tredecim, pallide fusca, luteo irregulariter radiata, laevia, dorsalia, leviter carinata. Scutellum vertebrale primum sexangulare, multo latius quam longum: secundum, tertium et quartum regulariter sexangularia, quintum quadrangulare, subconicum, basi latissimum. Scutellum primum laterale rhomboideum, secundum et tertium quinquangularia, quartum oblongum, subquadrangulare. Bractee marginales viginti quinque, antica ceteris brevior ac dilatata, cum proximis marginem tegens anticum, lunarem. Scutella versus marginem testae posticum latiora sunt, marginem ferratum et supra caudam bifidum constituentia.

Scutella lateralia marginis multo latiora quam in loricis Cheloniae Mydas eiusdem magnitudinis. Sternum huius speciminis non vidi.

Mensurae.

Longitudo testae	- - - -	1 ped. 2 poll. 3 lin.
Latitudo testae in primo scutello		
vertebrali	- - - -	— 9 poll. —
Latitudo testae in scutello tertio		
vertebrali	- - - -	1 ped. 1 poll. 3 lin.
Latitudo testae in quinto scutello		
vertebrali	- - - -	— 10 poll. 9 lin.
Altitudo testae sine sterno	- - - -	— 3 poll. 6 lin.

In juniore specimine musei Parisiensis aliam invenimus partium proportionem:

Longitudo animalis	- - - -	1 ped. 2 poll. —
Longitudo capitis	- - - -	— 2 poll. 6 lin.
Longitudo testae	- - - -	— 9 poll. 3 lin.
Longitudo annuli sternalis	- - - -	— 8 poll. —
Latitudo capitis	- - - -	— 1 poll. 8 lin.
Latitudo mediae testae	- - - -	— 8 poll. 6 lin.
Latitudo testae ad femora	- - - -	— 5 poll. —
Latitudo annuli sternalis	- - - -	— 4 poll. 10 lin.
Altitudo testae	- - - -	— 3 poll. 9 lin.

§. 4.

Spec. 5. Chelonia Mydas β . scutellis disci quindecim.

Testa demisse carinata, carina continua. Scutellum quintum vertebrale leviter gibbum. Scutella disci quindecim, disposita uti in Chelonia Caouana. Bracteae marginales viginti quinque. Ungues palmarum

plantarumque duo. Sternum tredecim arcis, utrinque rotundatum. Maxillae subintegrae. Intermedia itaque inter Ch. Mydas et Caouanam, priori tamen toto habitu maxime affinis est.

Menfurae.

Longitudo capitis	- - - - -	4 poll.	10 lin.
Longitudo colli	- - - - -	4 poll.	—
Longitudo testae	- - - - - 1 ped.	4 poll.	8 lin.
Longitudo annuli sternalis	- - 1 ped.	1 poll.	4 lin.
Latitudo capitis	- - - - -	9 poll.	6 lin.
Latitudo testae in scutello vertebrali			
secundo	- - - - -	5 poll.	8 lin.
Latitudo testae in scutello vertebrali			
quarto	- - - - -	9 poll.	6 lin.
Latitudo annuli sternalis summa	- -	7 poll.	5 lin.
Altitudo testae	- - - - -	6 poll.	8 lin.

§. 5.

Spec. I. Chelydra lacertina.

Caput ovatum, globosum, fronte depressa. Maxillae uncinatae integrae. Collum longe protractile, cum corpore papillosum. Testa convexa, oblonga, nigro-fusca: discus sulco circumscriptus, scutellis tredecim laevibus obtectus. Scutellum primum vertebrale subquadrangulare, angulis brevissimis: secundum, tertium et quartum sexangularia, angulis brevissimis, versus caudam decrefcentia in latitudine, complanata, sulco longitudinali dorsali loco carinae. Scutellum vertebrale quintum irregulare, in margine antico leviter arcuatum, in lateribus repando-sinuatum, in margine postico triangulare, ceterum complanatum, tuberculo trigono in
antica

antica parte. Scutella tria intermedia dorſi fulco levi circumſcripta ſunt. Scutellum laterale primum in utraque teſtae parte circuli ſegmentum aequat: ſecundum et tertium quinquangularia demiſſe carinata, carina continua, quintum ſimiliter conformatum, at irregularius. Bracteae viginti quinque marginem conſtituunt: antica brevis ac lata, qualis in Cheloniarum ſpeciebus conſpicitur, reliquae anticae et laterales anguſtae, femorales latiſſimae, omnes integerrimae, poſticae dentium inſtar protractae.

Bracteae ſterni novem, quarum antica triangularis, cuneiformis, proximae pyramidales, angulis quatuor: poſticae triangulares; intermediae quinquangulares. Annulus ſternalis anguſtiſſimus; in utroque latere, mediante proprio officulo, teſtae per ſymphyn adhaeret. Pedes large palmati ſunt, papilloſi, ſquamis ſingulis, palmarum ungues quinque, plantarum quatuor: digitus quintus inermis. Cauda longiſſima, papilloſa, tuberculis longitudinalibus in criſtam diſpoſitis.

Meſurae.

Longitudo animalis	- - - -	2 ped. 3 poll. 4 lin.
Longitudo capitis	- - - -	— 3 poll. 6 lin.
Longitudo colli non protracti	- - - -	— 1 poll. 4 lin.
Longitudo teſtae	- - - -	1 ped. — —
Longitudo caudae	- - - -	— 10 poll. 6 lin.
Longitudo annuli ſternalis	- - - -	— 8 poll. 3 lin.
Latitudo capitis	- - - -	— 3 poll. 3 lin.
Latitudo teſtae in ſcutello dorſali primo	- - - -	8 poll. 4 lin.
Latitudo teſtae in ſcutello dorſali quarto	- - - -	8 poll. 11 lin.
Latitudo annuli ſternalis	- - - -	— 4 poll. 3 lin.
Altitudo teſtae	- - - -	— 4 poll. 6 lin.

Archiv für Naturwiſſenſch. III. St.

Y

§. 6.

Spec. 4. *Emys nasuta.*

Caput ovatum, demisse convexum, scutellulis numerosissimis obtectum, naso tuberculato, in cylindrum brevem protracto. Maxilla superior, versus apicem leviter utrinque sinuata, inferior obtusa, hamata, integra. Collum papillosum, cirrhis duobus albidis filiformibus sub maxilla inferiore. Testa humilis fusca, scutellis punctato-rugosis, non areolatis, vertebralibus obtuse carinatis. Scutellum dorsale primum in margine antico angulato-arcuatum, et inde quinquangulare: secundum et tertium sexangularia, quartum sexangulare, ceteris minus; quintum quadrangulare, postice dilatatum. Scutellum laterale anticum circuli segmentum aequat, secundum et tertium quinquangulata, quartum minimum subquadratum. Margo testae integer, bracteis viginti quinque, quarum antica quadrato-oblonga, laterales albido marginatae, femorales paululum maiores. Sternum tredecim areis, antice rotundatum, postice bifidum, fuscum, utrinque luteo marginatum. Pedes squamosi, digiti larga membrana conjuncti: palmarum ungues quinque, plantarum quatuor, digito quinto inermi. Cauda non exserta.

Similis species nostra *E. dorsatae*, differt autem carina humili, figura scutelli marginalis antici et cirrhis mentalibus.

Mensurae.

Longitudo animalis collo non protracto	3 poll.	—
Longitudo-capitis - - - - -	—	7 lin.
Longitudo testae - - - - -	2 poll.	2 lin.
Longitudo caudae - - - - -	—	4 lin.

Longitudo sterni	- - - - -	1 poll.	9 lin.
Latitudo capitis	- - - - -	—	5 lin.
Latitudo testae in scutello secundo			
dorsali	- - - - -	1 poll.	6 lin.
Latitudo testae in scutello quarto			
vertebrali	- - - - -	1 poll.	9 lin.
Latitudo marginis sterni antici	- -	—	5 lin.
Latitudo medii sterni	- - - -	—	11 lin.
Latitudo marginis sterni postici	-	—	4 lin.
Altitudo testae	- - - - -	—	7 lin.

§. 7.

Spec. 5. *Emys leprosa* Schoepf.

Caput cute laevi vestitum, ovatum, fronte complanata, ore acuto. Maxilla superior versus apicem utrinque sinuata, ceterum integra, inferior hamata, acuta. Collum striis longitudinalibus papillofis ornatum. Testa ovata, obscure flavida. Scutella disci tredecim, singulis tuberculis calcareis quasi verrucosa. Scutella vertebralia tuberculato-carinata: primum quinquangulare, margine antico latiori, rotundato, secundum et tertium sexangularia, quartum irregulariter sexangulatum, versus marginem posticum angustatum, sinuatum, quintum postice dilatatum, utrinque arcuatum. Scutella lateralia antica circuli segmentum aequant, secundum et tertium quinquangularia, quartum quadrangulare, ceteris minus. Bractee viginti quinque marginem constituunt, antico leviter sinuatum, in lateribus nonnihil revolutum, ad femora dilatatum, supra caudam declivem. Bractea antica ceteris minor, ad basin sinuata: omnes concolores, tuberculis calcareis rarioribus. Sternum antice truncatum, postice bifidum, in duodecim areas divisum, per

symphylin cum testa conjunctum: bractee nigricantes, luteo irregulariter marginatae. Pedes squamosi, digiti larga membrana conjuncti. Palmarum ungues quinque, plantarum quatuor, digitus quintus inermis. Cauda longe exserta, squamosa.

Menfurae,

Longitudo capitis	- - - - -	1 poll. —
Longitudo testae	- - - - -	3 poll. 3 lin.
Longitudo caudae	- - - - -	1 poll. 6 lin.
Longitudo sterni	- - - - -	3 poll. 1 lin.
Latitudo capitis	- - - - -	— 7 lin.
Latitudo testae in scutello secundo dorsali	- - - - -	2 poll. 4 lin.
Latitudo testae in scutello dorsali quarto	- - - - -	2 poll. 5 lin.
Latitudo marginis sterni anterioris	- - - - -	— 8 lin.
Latitudo medii sterni	- - - - -	1 poll. 6 lin.
Latitudo marginis sterni posterioris	- - - - -	— 7 lin.
Altitudo testae	- - - - -	1 poll. 2 lin.

§. 8.

Spec. 6. *Emys cayennensis*.

Caput squamis membranaceis obtectum. Bractea ovalis in vertice, maculis duabus luteis insignis: minores circa oculos, luteo maculatae. Maxillae integerrimae. Nasus longitudinaliter profunde sulcatus. Collum nudum. Testa cum capite flavo-viridis, ovalis, convexa. Scutella disci tredecim: dorsale anticum planum et quinquangulare, secundum et tertium sexangularia cum quarto carinata, quod irregulariter quinquangulare: quintum quadrangulare, planiusculum, in margine posteriori latiori rotundato-angulatum. Scutella disci lateralia irregularia: primum circuli segmentum aequat, secundum et tertium quinquangularia, in basi varie an-

gulata, quartum ceteris minus, primo simile. Areolae laeves, lineolis irregulariter circumscriptae, in angulo posteriori et superiori scutellorum lateralium positae et in scutello laterali quarto versus angulum inferiorem ac posticum. Margo scutellorum posticus niger est. Margo testae bracteis viginti quatuor munitus est, quorum duae anticae minores, obliquae, cum proximis maioribus sinum testae triangularem circumdant. In lateribus loricae bracteae marginales, angustiores sunt, dilatatae supra caudam ac femora. Sternum dilute fuscum, tredecim bracteis obtectum. Corpus sterni angustum; processus, quibus cum testa connectitur, dilatati: lobus anterior truncatus, crenulatus, posterior bifidus, dentibus rotundatis, media pars sterni bracteis quatuor obtecta. Pedes palmati, pentadactyli, anteriores unguibus quinque, posteriores unguibus quatuor armati. Cauda vix exserta.

Menfurae.

Longitudo capitis	- - - - -	1 poll.	5 lin.
Longitudo testae	- - - - -	5 poll.	6 lin.
Longitudo sterni	- - - - -	5 poll.	—
Latitudo capitis	- - - - -	—	7 lin.
Latitudo testae in scutello secundo vertebrali	3 poll.	11 lin.	
Latitudo testae in scutello quarto vertebrali	4 poll.	4 lin.	
Latitudo marginis sterni antici	- -	—	10 lin.
Latitudo corporis sterni	- - - -	2 poll.	—
Latitudo marginis sterni postici	- -	1 poll.	—
Altitudo testae	- - - - -	2 poll.	1 lin.

9. 9.

Spec. 7. *Emys gibba*.

Caput nigrum, depressum, scutellis numerosis membranaceis obtectum. Collum elongatum, papillosum.

Testa ovalis, nigra, versus marginem anteriorem declivis, fere horizontalis. Tredecim scutella discum occupant, quorum quinque dorsalia, versus marginem testae posticum angustiora: primum planum, quadrangulare, marginē antico latissimo repando-angulato: secundum sexangulare postice gibbum: tertium sexangulare, tuberculo maiori: quartum minimum, irregulariter sexangulare: quintum irregulare, tuberculo triangulari plano munitum, tanquam processu carinae dorsalis. Pars anterior huius scutelli a tubere oblecta et angusta est, latera cum margine posteriori dilatato ac sinuoso complanata. Scutella disci lateralia versus marginem testae posticum minora, quartum minimum. Primum subquadrangulare, margine exteriori latissimo: secundum, tertium et quartum quadrangularia, margine superiori et inferiori repando. Margo testae integer, postice dilatatus, bracteis viginti quatuor oblectus, quarum antica angustissima, longa, cum proximis quadratis ac latissimis plana: laterales revolutae, femorales horizontales, caudales declives. Sternum in tredecim areas divisum, antice rotundatum, postice bifidum, lobis acutis. Pedes squamosi, palmati, pentadactyli, palmarum unguibus quinque, plantarum quatuor. Cauda vix exserta.

Menfurae.

Longitudo capitis	- - - - -	1 poll. 3 lin.
Longitudo colli protracti	- - - - -	1 poll. 2 lin.
Longitudo testae	- - - - -	5 poll. 8 lin.
Longitudo caudae	- - - - -	— 8 lin.
Longitudo sterni	- - - - -	5 poll. 4 lin.
Latitudo capitis	- - - - -	1 poll. 1 lin.
Latitudo testae in scutello secundo dorsali		3 poll. 7 lin.

Latitudo testae in scutello quarto

dorsali - - - - -	4 poll. 2 lin.
Latitudo marginis sterni anterioris - - -	1 poll. 4 lin.
Latitudo medii sterni - - - - -	1 poll. 6 lin.
Latitudo marginis sterni posterioris - - -	1 poll. 2 lin.
Altitudo testae - - - - -	2 poll. —

§. 10.

Spec. 8. *Emys expansa*.

α. testa e museo cel. Richard.

Testa oblonga, depressa, laevis, nigro-fusca, scutellis complanatis, latissimis, curvilineis. Tredecim scutella discum constituunt: primum vertebrale subquadratum, margine antico leviter arcuato in angulum brevem protracto: secundum et tertium sexangularia, marginibus lateralibus undulatis, antico rotundato, postico sinuato, ceterum demisse ac obtuse carinata: quartum irregulariter sexangulare, planum, postice angustius: quintum antice angustum, postice dilatatum, arcuatum. Scutellum primum laterale circuli quadrantem aequat: secundum et tertium oblonga, quadrangularia, margine antico undulato: quartum ceteris minus, quadratum, subrectilineum. Bracteae marginis viginti quatuor, duae anticae in commissura breviores, et inde margo anterior sinuatus; femorales et caudales latissimae, subhorizontales, commissuris rectilineis. Sternum solidum, intime cum testa connatum, in tredecim areas divisum, et totidem bracteis munitum, sine ullo scutello accessorio. Lobus sterni anterior rotundatus, posticus bifidus, alis rotundatis.

Mensurae.

Longitudo testae	- - - - -	1 ped. 2 poll. 6 lin.
Longitudo sterni	- - - - -	1 ped. 1 poll. 6 lin.
Latitudo testae in scutello primo vertebrali		7 poll. 8 lin.
Latitudo testae in scutello tertio vertebrali		11 poll. 6 lin.
Latitudo testae in scutello quarto vertebrali		10 poll. 8 lin.
Latitudo marginis sterni anterioris	- -	5 poll. 6 lin.
Latitudo corporis sterni	- - -	9 poll. —
Latitudo marginis sterni posterioris	- -	3 poll. 3 lin.
Altitudo testae	- - - - -	5 poll. 2 lin.

β. var. e mus. Paris.

marginē testae postico declivi, non horizontali.

Caput ovale glabrum, naso longitudinaliter sulcato. Maxillae integrae, superior leviter sinuata, inferior obtusa, vix arcuata. Collum crassum. Pedes pentadactyli, unguibus palmarum quinque, plantarum quatuor. Digi-
gitum larga membrana conjuncti.

Mensurae.

Longitudo capitis	- - - - -	2 poll. 10 lin.
Longitudo colli protracti	- - -	2 poll. —
Longitudo testae	- - - - -	1 ped. 2 poll. 11 lin.
Longitudo sterni	- - - - -	1 ped. 1 poll. 4 lin.
Latitudo capitis	- - - - -	2 poll. —
Latitudo testae in scutello secundo dorsali		8 poll. 10 lin.
Latitudo testae in scutello quarto vertebrali		10 poll. 3 lin.
Latitudo marginis sterni anterioris	- -	5 poll. —
Latitudo marginis sterni posterioris	- -	4 poll. 7 lin.
Latitudo corporis sterni	- - - - -	5 poll. 6 lin.
Altitudo testae	- - - - -	5 poll. 5 lin.

§. II.

Spec. 9. *Emya Dumeriliana*.

Caput crassum, naso convexo glaberrimo, obtuso. Maxilla superior uncinata, utrinque profunde sinuata: inferior quam maxime hamata, acuta. Testa nigra, ovalis, postice dilatata, scutellis planiusculis, irregularibus. Scutellum primum dorsale quadratum, secundum, tertium et quartum quadrangularia, postice angustiora: quintum suborbiculare, in margine antico et postico truncatum. Scutellum laterale primum circuli quadrantem aequat, secundum, tertium et quartum subquingularia. Bracteae marginis viginti quatuor, duae anticae minores, in commissura angustatae, proximae latiores et sic scutella marginalia latitudine crescunt versus caudam. Margo testae posticus leviter complanatus. Sternum in tredecim areas divisum, antice rotundatum, subtruncatum, postice bifidum, intime cum testa conjunctum. Corpus cum pedibus nudum. Pedes palmati, pentadactyli, palmarum ungues quinque, plantarum quatuor. Cauda crassa, acuta, exserta.

Mensurae.

Longitudo capitis	- - - - -	4 poll.	5 lin.
Longitudo colli protracti	- - - - -	2 poll.	9 lin.
Longitudo testae	- - - - -	1 ped. 2 poll.	6 lin.
Longitudo sterni	- - - - -	1 ped.	—
Longitudo caudae	- - - - -	1 poll.	10 lin.
Latitudo capitis	- - - - -	3 poll.	3 lin.
Latitudo testae in scutello vertebrali secundo	- - - - -	10 poll.	—
Latitudo testae in scutello vertebrali quarto	- - - - -	10 poll.	3 lin.

Latitudo marginis sterni anterioris	- - - - -	6 poll.	—
Latitudo corporis sterni	- - - - -	5 poll.	6 lin.
Latitudo marginis sterni posterioris	- - - - -	4 poll.	5 lin.
Altitudo testae	- - - - -	5 poll.	11 lin.

§. 12.

Spec. 10. *Emys reticulata* Bosc.

Emys reticulata, ut et *ferrata*, a Daudin quidem jam descripta est; adeo tamen confusis characteribus singularum specierum, ut novae expositionis desiderium oriatur. Examinavimus testam e proprio museo ill. Bosc.; ita conformatam, ut nunc explicabitur.

Testa humilis, antice et postice declivis, in lateribus convexior, scutellis dorsalibus mediis complanatis. Discus sulco levi circumscriptus. Scutella nigra, vix areolata, lineis luteis reticulata, cum lineola longitudinali, carinae instar, vertebrae incumbente. Reticulum irregulare interstitiis spatiosis. Ceterum scutella glabra, levissime rugosa: primum dorsale quinquangulare, angulo marginis anterioris protracto et truncato, postico angustiore curvilineo: secundum sexangulare, in margine antico curvilineum: tertium sexangulare, margine postico profunde sinuato: quartum sexangulare, antice arcuatum, postice angustius, sinuatum: quintum utrinque rotundatum, pyramidale, in basi latissimum. Scutellum laterale primum circuli quadrantem aequat: secundum et tertium quinquangularia, angulo superiori brevissimo: quartum trapezoideum. Margo integerrimus, bracteis viginti quinque munitus, quarum antica linearis longa. Bracteae laterales ceteris angustiores, femorales cum anterioribus multo latiores, subhorizontales,

caudales paululum breviores. Scutella marginalia in pagina superiori nigra, in inferiori lutescentia, maculis sparsis nigris. Sternum utrinque truncatum, in duodecim areas divisum, per symphysin cum testa conjunctum.

Mensurae.

Longitudo testae	- - - - -	6 poll. 4 lin.
Latitudo testae in scutello secundo vertebrali	- - - - -	3 poll. 11 lin.
Latitudo testae in scutello quarto vertebrali	- - - - -	4 poll. 5 lin.
Longitudo sterni	- - - - -	5 poll. 10 lin.
Latitudo marginis sterni anterioris	- - - - -	1 poll. 6 lin.
Latitudo corporis sterni	- - - - -	2 poll. 7 lin.
Latitudo marginis sterni posterioris	- - - - -	1 poll. 1 lin.
Altitudo testae	- - - - -	2 poll. 6 lin.

§. 13.

Spec. 12. *Emys ferrata* Daud.

Caput ovale, planum, cute laevi obtectum, ore obtuso. Maxillae integrae, superior versus apicem levissime sinuata. Collum papillosum, squamulis sparsis. Testa convexa, ovalis, nigro-fusca, striis irregularibus, pallide luteis variegata. Tredecim scutella, vix areolata, discum occupant: vertebralia quinque, interrupte carinata, carina in margine postico uniuscuiusque scutelli incrassata. Sulcus discum circumdat, ad femora profundior. Scutellum dorsale primum oblongum, in medio marginis anterioris et posterioris protractum: secundum et tertium sexangularia: quartum sexangulare, postico angustius: quintum pyramidale, antice rotundatum. Scutellum laterale primum circuli quadrantem aequat: secundum et tertium latissima, in margine superiori an-

gulata: quartum trapezoideum. Margo testae antice truncatus, sinuatus, subhorizontalis, postice declivis, scutellis femoralibus latioribus. Bracteae viginti quinque marginales, antica linearis, laterales leviter revolutae, posticae sinuatae et in adultis bifidae, in pagina superiori nigro-fuscae, nonnihil luteo variegatae, in pagina inferiori lutescentes, laterales macula rotunda nigra insignes. Sternum intime cum testa conjunctum, bracteis duodecim lutescentibus obtectum, antice truncatum, postice profunde sinuatum. Pedes palmati pentadactyli, palmarum unguibus quinque, plantarum quatuor, digito quinto inermi. Cauda vix exserta.

Mensurae.

Longitudo capitis	- - - - -	1 poll. 2 lin.
Longitudo testae	- - - - -	5 poll. 1 lin.
Longitudo sterni	- - - - -	4 poll. 9 lin.
Latitudo testae in scutello vertebrali secundo		4 poll. 4 lin.
Latitudo testae in scutello vertebrali quarto		4 poll. 5 lin.
Latitudo capitis	- - - - -	— 7 lin.
Latitudo marginis sterni anterioris	- - -	— 8 lin.
Latitudo medii sterni	- - - - -	2 poll. 7 lin.
Latitudo marginis sterni posterioris	- - -	— 8 lin.
Altitudo testae	- - - - -	2 poll. 3 lin.

§. 14.

Spec. 13. *Emys discolor* Thunb.

Huius speciei, quae in museo Upsaliensi servatur, ill. Thunberg descriptionem sequentem mecum communicavit.

„Testa magnitudine manus, ovato-oblonga, duplo longior quam lata, convexa, dorso plana, lateribus de-

clivis, antice posticeque parum excisa, sordide flava, fasciis variis inaequalibus, frequentibus, fuscis. Scutella omnia striata, striis intra marginem pluribus atque rarioribus, parum profundis. Scutella dorsalia quinque: primum maximum, antice latius, quadrangulum: secundum quadratum: tertium quadrangulare, prioribus paululum longius: quartum rhombeum, minimum: quintum angustatum, postice dilatatum. Scutella disci lateralia utrinque quatuor: anticum subrhombeum: intermedia quadrata, posticum angulo infimo productum. Scutella marginalia viginti quinque, subquadrata, inaequalia, postice subserrata, anteriora retroflexa, femoralia dilatata, anticum impar, lineare. Sternum antice rotundatum, postice bifido-excisum, atrum, marginibus flavis. Scutella tria antica minora, quorum lateralia triangularia, intermedium quinquangulare. Secundum par subquadratum, margine interno rotundato: tertium angustissimum, parallelogrammiforme: quartum et quintum quadrata, maiora sextum duplo fere minus. Scutella sterni omnia in margine interiori et superiori striis pluribus notata. Margines testae laterales inferne flavi, maculis fasciolisque nigris. Suturae omnes albicantes. — Digi-
 ti distincti, unguiculati, ceterum animal ignotum. Patria ignota."

§. 15.

Spec. 15. *Emys lutescens*.

Caput glabrum, sine ullo scutello, fronte complanata, rostro obtuso. Collum laeve. Testa sordide lutea, ventricosa, oblonga, dorso complanato, leviter et obtuse carinato. Scutella disci tredecim: primum verte-

brale quinquangulare, angulō antico rotundato, margine postico angulato: secundum et tertium quadrata, angulo brevi profliente in media parte marginis antici et lateralium, margine postico sinuato: quartum similiter conformatum, at in margine postico triangulariter excisum: quintum denique irregulare, margine antico triangulari, undulato, postico arcuato, angulato, latiori. Scutellum laterale primum irregulare: secundum, tertium et quartum quadrata, margine exteriori varie angulato, quartum ceteris minus. Margo testae integer, supra collum leviter sinuatus, scutellis viginti quinque munitus, quorum anticum minimum, femoralia reliquis majora. Sternum in duodecim areas divisum, planum, fuscum, antice retusum, postice bifidum, lobis obtusis. Pedes palmati, pentadactyli, palmarum unguibus quinque, plantarum quatuor, cum digito quinto inermi. Cauda teres, laevis, exserta.

Mensurae.

Longitudo capitis	- - - - -	1 poll. 3 lin.
Longitudo testae	- - - - -	5 poll. 7 lin.
Longitudo sterni	- - - - -	5 poll. 3 lin.
Latitudo testae in scutello secundo vertebrali		3 poll. 5 lin.
Latitudo testae in scutello quarto vertebrali		3 poll. 9 lin.
Latitudo marginis sterni antici	- - -	1 poll. —
Latitudo corporis sterni	- - -	2 poll. 3 lin.
Latitudo marginis sterni postici	- -	1 poll. 2 lin.
Altitudo testae	- - - - -	2 poll. 1 lin.

§. 16.

Spec. 15. *Emys Geoffroana*.

Caput ovale, nigerrimum, depressum, ore obtuso, maxillis integris. Collum crassum, longum, cum capite

ad latera recondendum, nigrum, inferne striis nonnullis flavis. Testa nigra, convexa, dorso complanato, scutellis vertebralibus obtuse et interrupte carinatis, antice declivis, lateribus retroflexis. Scutellum primum vertebrale subquadratum, complanatum, in margine antico undulatum ac dilatatum: secundum, tertium et quartum sexangularia: quintum pyramidale. Scutellum laterale primum obliquum, margine exteriori dilatato: secundum, tertium et quartum subquinguangularia, longa. Bracteae viginti quinque marginem tegunt, antica angustissima, longa. Sternum in tredecim areas divisum, per lymphysin cum testa conjunctum, antice truncatum, emarginatum, postice profunde sinuatum, lobis subacutis. Pedes palmati, pentadactyli, plantarum digitus quintus inermis.

Mensurae.

Longitudo capitis	- - - - -	2 poll. 6 lin.
Longitudo colli protracti	- - - - -	4 poll. 5 lin.
Longitudo testae	- - - - - 1 ped.	2 poll. 4 lin.
Longitudo sterni	- - - - - 1 ped.	1 poll. 3 lin.
Longitudo caudae	- - - - -	1 poll. 2 lin.
Latitudo capitis	- - - - -	2 poll. 5 lin.
Latitudo testae in scutello secundo vertebrali	- - - - -	9 poll. 3 lin.
Latitudo testae in scutello quarto vertebrali	- - - - -	10 poll. 2 lin.
Latitudo marginis sterni antici	- - - - -	4 poll. 9 lin.
Latitudo medii sterni	- - - - -	6 poll. —
Latitudo marginis sterni postici	- - - - -	3 poll. 9 lin.
Altitudo testae	- - - - -	5 poll. 1 lin.

§. 17.

Spec. 24. *Emys olivacea*.

Testa planiuscula, oblonga, pallide fusca, scutellis disci tredecim, quorum primum dorsale quinquangulare, angulo antico brevi, secundum et tertium sexangulare, multo latiora quam longa, quartum sexangulare, postice angustatum, quintum trapezoideum. Scutellum laterale primum et quartum circuli quadrantem æquant: duo intermedia quinquangularia. Areola uniuscuiusque scutelli, imprimis autem scutellorum dorsalium paululum protracta est et rugae laeves exinde versus marginem bractee tendunt. Sulci duo ab areola et inter se distantes bractearum et areolarum ambitum circumscribunt, (qualis enim bractearum forma, talis in plerisque Cheloniis areolarum et sulcorum figura). Scutella marginalia viginti quatuor, fere quadrata, antica maiora, lateralia angustissima, femoralia dilatata. Margo testae levissime crenulatus. Sternum — Animal —.

Mensurae.

Longitudo testae - - - - - 4 poll. —
 Latitudo testae in scutello secundo vertebrali 2 poll. 9 lin.
 Latitudo testae in scutello quarto vertebrali 3 poll. —
 Altitudo testae sine sterno - - - - - 1 poll. 3 lin.

§. 18.

Spec. 27. *Emys Adansonii*.

Testa demisse convexa, margine posteriori dilatato, scutellis disci tredecim: primum vertebrale planum, longissimum, panduraeforme, margine anteriori undulato, angulis lateralibus elongatis, margine postico rectilineo: secundum planum et sexangulare, versus marginem posteriorum leviter carinatum: tertium excelsè carinatum, sexan-

sexangulare, carina utrinque in dentem complanatum profiliante: quartum irregulariter sexangulare, carinatum, carina postice tuberculosa, in margine postico angustatum, sinuatum: quintum leviter carinatum, triangulare, apice rotundato sinum scutelli quarti explens, in margine postico dilatatum, undulato-arcuatum. Scutellum laterale primum irregulare, reliqua quadrangularia, marginibus inferioribus varie angulatis, intermedia reliquis maiora. Bractee marginales viginti quatuor, laterales angustiores, femorales ceteris maiores, duo anticae ovato-quadratae, rectae. Margo testae integer, antice et postice levissime sinuatus. Tota testae flava, punctis copiosissimis nigris eleganter adpersa.

Mensurae.

Longitudo testae	- - - - -	5 poll. 8 lin.
Latitudo testae in scutello vertebrali primo		3 poll. 2 lin.
Latitudo testae in scutello dorsali tertio		4 poll. 2 lin.
Latitudo testae in scutello vertebrali quarto		4 poll. 6 lin.
Altitudo testae sine sterno	- - - - -	1 poll. 10 lin.

§. 19.

Spec. 32. *Emys trijuga*.

Testa convexa fusca, disco tricarinato, scutellis tredecim oblecto, sulco profundo utrinque prope marginem circumscripto. Scutellum primum vertebrale oblongum, curvilineum, antice parum dilatatum, demisse carinatum: secundum et tertium sexangularia, excelsae carinata, carina in scutellorum commissa interrupta: quartum sexangulare, excelsae carinatum, postice angustatum, angulis lateralibus acutioribus: quintum pyramidale, postice dilatatum, carinatum. Scutellum laterale anticum circuli quadrantem aequat, carina gibbosa: secundum et

tertium irregulari - quinquangularia, obtuse carinata, curvilinea: quartum subquadratum, subcarinatum. Bracteae marginales viginti quinque, femorales latiores, caudales breviores, ceterum omnes fuscae, in margine-exteriori flavo marginatae, singulae in pagina inferiori macula triangulari nigra notatae. Scutellum marginale anticum ceteris angustius est, subtrigonum, apice rotundato: reliqua subaequalia, in commissuris leviter protracta, et inde margo testae subserratus. Areolae nigrae, punctato-rugosae. Sternum antice truncatum, sinuatum, postice bifidum, scutellis duodecim flavis, nigro notatis; cum testa processibus altissimis, bracteis propriis munitis, per symphyse conjunctum. Animal ignotum. Differt species nostra ab affinibus:

a. ab *E. Retzii*.

1. sterno immobili, antice truncato, postice bifido.
2. areis quatuor corporis sterni.
3. testa multo maiore, et celerius ossescente.

Sternum loricae a cel. Lechenault museo Parisiensi traditae in centro adhuc membranaceum est, contra vero specimen *E. Retzii*, quod examinavi, licet multo minus, sternum jam tubique clausum habet.

4. areolis minoribus et rugis scutellorum rarioribus.
5. scutellis marginalibus viginti quinque.

β. ab *Emyde scorpioidea*.

1. sterno immobili, areis quatuor in medio lobo.
2. carinis interruptis, subgibbis.
3. scutellis lateralibus marginis latis.
4. disco testae sulco profundo circumscripto.
5. testa ovata, scutellis vertebralibus latioribus quam longis.

Mensurae.

Longitudo testae - - - - - 3 poll. 6 lin.

Latitudo testae in scutello quarto vertebrali	2 poll. 8 lin.
Latitudo testae in scutello secundo vertebrali	2 poll. 6 lin.
Longitudo sterni - - - - -	3 poll. —
Latitudo marginis sterni antici - - -	1 poll. —
Latitudo corporis sterni - - - - -	1 poll. 7 lin.
Latitudo marginis sterni postici - - -	— 7 lin.
Altitudo testae - - - - -	1 poll. 7 lin.

§. 20.

Spec. 33. *Emys Herrmanni*.

Caput ovale, glabrum, fronte complanata, ore obtuso. Maxillae subintegrae, superior versus apicem leviter sinuata, inferior paululum uncinata, obtusa. Collum teres, papillosum. Testa fusca, demisse convexa, tricarinata: carinae continuae acutae. Scutella disci tredecim, laevia, striis singulis rugosis, areolis vix conspicuis, leviter protractis. Scutellum primum vertebrale carinatum, curvilineum, irregulari-quinquangulare, margine antico rotundato, in lateribus repandum: secundum et tertium carinata, sexangularia, angulis brevibus: quartum carinatum, sexangulare, postice angustatum, truncatum: quintum triangulum, carinatum, antice acutum, postice dilatatum, angulatum. Scutellum laterale primum circuli quadrantem aequat, carinatum, in angulo superiori et posteriori gibbum: secundum et tertium quinquangularia, carinata, in eodem angulo gibba: quartum subquadratum, curvilineum. Bracteae marginales viginti quinque, subquadratae, antica angusta, pyramidalis, in basi sinuata, apice obtuso, proximae multo maiores, laterales vix minores, revolutae, femorales latiores, caudales breviores. Margo integar, supra collum et caudam sinuatus. Sternum antice truncatum, postice bifidum, lobis acutiusculis, in

duodecim areas divisum, per symphyfin cum testa conjunctum. Areae quatuor mediam partem sterni component, et bractea accessoria in utroque margine processuum lateralium sterni. Pedes squamosi palmati, palmarum ungues quinque, plantarum quatuor, cum digito quinto inermi. Cauda teres exserta. Differt a similibus:

a. Emyde trijuga.

1. disco non circumscripto.
2. carinis continuis.
3. bracteis marginalibus unicoloribus.
4. areolis vix distinctis.
5. sterno humiliori fusco, processibus multo brevioribus.

β. ab Emyde Retzii.

1. lobo sterni postico bifido.
2. areis medii sterni quatuor.
3. areolis vix distinctis.
4. bracteis marginalibus viginti quinque.
5. Cauda exserta.
6. sterno immobili.

Mensurae.

Longitudo capitis	- - - - -	1 poll.	2 lin.
Longitudo colli protracti	- - - - -	1 poll.	8 lin.
Longitudo testae	- - - - -	6 poll.	5 lin.
Longitudo sterni	- - - - -	5 poll.	11 lin.
Longitudo caudae	- - - - -	1 poll.	6 lin.
Latitudo capitis	- - - - -	—	11 lin.
Latitudo testae in scutello vertebrali secundo	- - - - -	4 poll.	2 lin.
Latitudo testae in scutello vertebrali quarto	- - - - -	4 poll.	4 lin.
Latitudo marginis sterni antici	- - - - -	1 poll.	3 lin.
Latitudo corporis sterni	- - - - -	2 poll.	9 lin.
Latitudo marginis sterni postici	- - - - -	1 poll.	1 lin.
Altitudo testae	= = = = =	2 poll.	—

§. 21.

Spec. 38. *Emys castanea*.

Testa ovalis, convexa, badia. Scutella disci tredecim, sublaevia, areolis nigris rugosis latis. Rugae tenerae ab arcolis versus scutellorum margines tendunt. Scutellum vertebrale primum oblongum, quadrangulare, vix carinatum, margine anteriori latiori ac rotundato: secundum irregulari-sexangulare, antice angustius, carinatum: tertium sexangulare, carinatum: quartum irregulari-sexangulare, postice angustatum, carinatum: quintum subtriangulum, levissime carinatum. Carina continua, acuta. Scutellum laterale primum circuli quadrantem aequat: secundum et tertium oblonga, quadrangularia: quartum quadratum. Bractee marginales viginti quatuor, duae anticae proximis minores, subquadratae, rectae: laterales angustissimae, femorales latissimae, caudales paululum minores, quadratae. Sternum in tredecim areas divisum, luteum, maculis latis fuscis. Lobus anterior mobilis, rotundatus, in areas septem partitus, quarum antica longa, subquingularis, cum duabus lateralibus triangulis conjuncta, reliquae oblongae, margine interiori angustiore. Lobus posticus angustus, bifidus, laciniis acutis, bracteisque quatuor obtectus. Lobus intermedius e duabus tantum arcis quadrangularibus constat, intime cum testa conjunctus.

Mensurae.

Longitudo testae	- - - - -	2 poll. 9 lin.
Longitudo sterni	- - - - -	2 poll. 6 lin.
Longitudo lobi anterioris sterni	- - -	1 poll. —
Latitudo testae in medio dorsi	- - -	2 poll. 1 lin.
Latitudo testae in scutello dorsali quarto	-	2 poll. 2 lin.

Latitudo lobi antici sternalis	1 poll. 6 lin.
Latitudo sterni medii	1 poll. 8 lin.
Latitudo lobi sternalis postici	1 poll. 3 lin.
Altitudo testae	1 poll. 1 lin.

§. 22.

Spec. 41. *Emys Conro Lechen.*

Testa globosa, dorso complanato, demisse carinato. Scutella disci tredecim: primum vertebrale quinquangulare, margine anteriori arcuato: secundum, tertium et quartum sexangularia: quintum irregulare longum, versus caudam dilatatum. Scutella lateralia convexa, leviter et acute carinata: primum circuli quadrantem aequat: secundum et tertium sexangularia: quartum minimum, quadrangulum. Margo testae integer, bracteis viginti quinque munitus, quarum antica angustissima, reliquae subaequales, supra pedes anteriores et posteriores paululum revolutae. Sternum integrum, bivalve, utrinque rotundatum, areis duodecim, ambitum testae undique tegens, et ligamento adhaerens. Testa nigricans, sternum sordide luteum, maculis nigris nebulosis, quae et in pagina inferiori bractearum marginalium conspiciuntur.

Descriptionem animalis, quod non vidi, cel. Leche-
nault e schedulis suis sic dedit: Corpus nigrum, luteo
variegatum. Caput oblongum, lineola lutea juxta oculos.
Pedes palmati, pentadactyli, palmarum unguibus quin-
que, plantarum quatuor, cum digito quinto mutico. —
Vidit quondam cel. vir in itinere emydem sine ullo scu-
tello. An chelonii bracteas deponant jam diu inter au-
ctores lis est, ista vero et alia Schneideri observatione
(i Beytrag zur Schildkr. pag. 13.) quaestio confirmari vi-
detur.

Mensurae.

Longitudo testae	- - - - -	11 poll.	—
Longitudo sterni	- - - - -	9 poll.	1 lin.
Latitudo testae in scutello secundo vertebrali	- - - - -	4 poll.	—
Latitudo testae in scutello quarto vertebrali	- - - - -	4 poll.	11 lin.
Latitudo sterni medii	- - - - -	3 poll.	9 lin.
Altitudo testae	- - - - -	2 poll.	10 lin.

§. 23.

Spec. 44. *Emys Schneideri*.

Testa convexa, carinata. Carina excelsa, in arcola uniuscunq̃ue scutelli dorsalis incrassata: tredecim discum constituunt. Scutellum primum vertebrale quinquangulare: secundum, tertium et quartum sexangularia, carina in utroque margine dentium instar profilicis: quintum quadrangulare, postice angulato-arcuatum. Scutellum laterale primum irregulare: secundum et tertium quinquangularia, quartum minimum, irregulari-quadrangulum. Margo bractealis viginti septem constituitur, quarum antica ceteris minor: ceterum margo integer, supra collum sinuatus. Areolae centrales, distinctae, lineis regulariter circumscriptae, macula nigro-fusca notatae. (Hisce characteribus species nostra facillime distinguitur ab *Emyde clausa*, cuius areolae excentricae, oblitteratae et unicolores sunt.) Sternum bivalve, antice rotundatum, postice truncatum, testam exacte claudens, in duodecim areas divisum. Lobus anterior mobilis, adscendens, posterior horizontalis, ligamentis cum priori et cum testa conjunctus. Medium sterni ex duobus areis formatum est.

Mensurae.

Longitudo testae	- - - - -	3 poll.	5 lin.
Latitudo testae in scutello secundo dorsali	- - - - -	2 poll.	4 lin.

Latitudo testae in scutello dorsali quarto 2 poll. 8 lin.

Altitudo testae - - - - - 1 poll. 4 lin.

In specimine maiori musei Herrmanniani, 3 poll. 9 lin. longo, altitudo testae increverat 7 lin., latitudo in scutello dorsali quarto tantum 2 lin., in scutello secundo autem 5 lin.

§. 24

Spec. 7. Testudo angulata Dumer.

Caput ovatum, squamosum, ore obtuso, maxillis serrulatis. Testa ventricosa, scutellis disci tredecim nigris, areolatis, areolis flavis. Scutella rectilinea, lineis pluribus elevatis insignia, quibus areolae circumdantur, quae depressae, centrales, rugosae, in centro leviter protractae. Scutella disci elevata, primum vertebrale quinquangulare, angulo antico protracto, retuso: secundum et tertium sexangularia: quartum sexangulare, postice angustatum: quintum pyramidale, in margine postico dilatatum, angulato-arcuatum. Scutellum laterale primum circuli quadrantem aequat: secundum et tertium quinquangularia: quartum obliquum, quadrangulare. Bractee marginis viginti quatuor, quarum antica linearis, proximis latioribus longior. Margo supra collum sinuatus, supra pedes declivis, in lateribus fere perpendicularis: bractea caudalis lata, uncinata, obtusa. Bractee ceterum luteae, cum macula triangulari marginis postici. Sternum antice truncatum, angustissimum, postice bifidum, lutescens, maculis striisque nigris; in undecim areas divisum. Pedes squamosi, palmarum ungues quinque, plantarum quatuor. Cauda crassa, exserta.

Mensurae.

Longitudo capitis - - - - - 11 lin.

Longitudo testae - - - - - 4 poll. 7 lin.

Longitudo sterni	4 poll.	4 lin.
Longitudo caudae	—	8 lin.
Latitudo capitis	—	7 lin.
Latitudo testae in scutello vertebrali primo	2 poll.	10 lin.
Latitudo testae in scutello vertebrali quarto	3 poll.	4 lin.
Latitudo marginis sterni anterioris	—	5 lin.
Latitudo corporis sterni	2 poll.	3 lin.
Latitudo marginis sterni posterioris	1 poll.	4 lin.
Altitudo testae	2 poll.	3 lin.

§. 25.

Spec. 12. Testudo rotunda Latr.

Haud superfluum credo novam huius testudinis descriptionem, quum auctores de hac specie mirum in modum dissentiant. Lacepede primus eam depinxit sub falso nomine testudinis orbicularis, et hinc ab aliis male varietas emydis europaeae habebatur. Nèque tamen aquatilis est; sed omnino terrestris, et recte a ccl. Latreille nova species dicta, iusto tamen breviori sermone.

Caput globosum, squamosum, ore acuto. Maxillae ferrulatae. Collum crassum, breve. Testa globosa, lutescens, punctis filaceis irregulariter adspersa. Scutellum vertebrale primum quinquangulare, angulo antico acuto: secundum et tertium sexangularia: quartum similiter conformatum, postice angustatum: quintum subquadratum, postice angulato-arcuatum. Scutellum laterale primum circuli quadrantem aequat: secundum et tertium quinquangularia: quartum quadrangulum, versus marginem exteriorum dilatatum. Bracteae marginales viginti tres, anticae aequales, laterales eiusdem magnitudinis, margine vix prominente, femorales paululum breviores: bractea postica in angulum obtusum protracta. Sternum intus cum testa conjunctum, in duodecim areas divisum, in specimini-

bus musej Parisiensis nondum clausum. Pedes squamosi, palmarum unguibus quinque, plantarum quatuor. Cauda crassa exserta, apice corneo.

Meusurae.

Longitudo capitis	- - - - -	— 7 lin.
Longitudo testae	- - - - -	2 poll. 2 lin.
Longitudo sterni	- - - - -	2 poll. —
Longitudo caudae	- - - - -	— 3 lin.
Latitudo capitis	- - - - -	— 6 lin.
Latitudo testae	- - - - -	1 poll. 7 lin.
Latitudo marginis sterni antici	- - - - -	— 6 lin.
Latitudo medii sterni	- - - - -	1 poll. 6 lin.
Latitudo marginis sterni postici	- - - - -	— 5 lin.
Altitudo testae	- - - - -	1 poll. —

§. 26.

Spec. 17. Testudo gigantea.

Caput globosum, squamosum, maxillis ferrulatis, parum uncinatis. Collum crassum. Testa conyexa, cylindracea, fusca, antice complanata et postice declivis. Scutellum dorsale primum quadrangulare, margine antico arcuato: secundum, tertium et quartum sexangularia: quintum pyramidale, ventricosum, postice latissimum, margine curvilineo. Scutellum laterale primum circuli quadrantem aequat: secundum, tertium et quartum quinquangularia. Bracteae viginti tres marginem constituunt, quarum duae anticae obliquae, in commissura angustatae, ceterum proximis similes: bractea caudalis gibbosa. Scutella omnia laevia, sine ullo sulco.

Margo testae lateralis rotundatus futuris ossibus cum sterno conjungitur, quod utrinque angustatum, in duodecim areas divisum. Pedes clavati, squamis numerosissimis,

latis ac robustis muniti, unguibus palmarum quinque, plantarum quatuor. Cauda crassa, non exserta.

Measurae.

Longitudo capitis	- - - - -	4 poll.	—
Longitudo colli protracti	- - - - -	1 poll.	10 lin.
Longitudo testae	- - - - -	2 ped. 4 poll.	—
Longitudo sterni	- - - - -	1 ped. 7 poll.	8 lin.
Longitudo caudae	- - - - -	2 poll.	6 lin.
Latitudo capitis	- - - - -	2 poll.	6 lin.
Latitudo testae in scutello secundo dorsali	1 ped.	—	10 lin.
Latitudo testae in scutello quarto dorsali	1 ped. 1 poll.	6 lin.	
Latitudo marginis testae in scutello dorsali			
antico	- - - - -	10 poll.	6 lin.
Latitudo marginis testae in scutello dor-			
sali postico	- - - - -	10 poll.	8 lin.
Latitudo lobi sterni antici	- - - - -	6 poll.	9 lin.
Latitudo medii sterni	- - - - -	1 ped.	— —
Latitudo lobi sterni postici	- - - - -	7 poll.	—
Altitudo testae	- - - - -	9 poll.	—

Caput IV.

Illustratio synonymorum.

§. I.

Spec. I. *Trionyx ferox* Penn.

The soft shelled Tortoise Penn. Philos. Transact. Vol. 61. Pars I. p. 266. tab. 10. fig. 1. 2. 3. — Penn. Suppl. of Arctic Zool. p. 78.

Hinc derivandae omnes huius speciei descriptiones, quae nunc existunt:

Trionyx Georgicus. Deux callosités, la queue presque aussi longue, que l'extrémité de la carapace. Geoffr. annal. du mus. d'hist. nat. XIV. pag. 17.

Testudo ferox, (la tortue de Ponnant) lorica dorsali fusca, coriacea, antice et postice tuberculosa. Dand. rept. II. 69. VIII. 308. — Fierce Tortoise Shaw Gen. Zool. III. p. 64. tab. 17. — Schoepf. test. p. 88. tab. 19. — Gmel. syst. nat. 1039. — Schneid. Schildkr. p. 330. Excludenda synonyma auctorum, quae omnia ad *Trionychem aegyptiacum* pertinent.

Testudo mollis, digitis membrana unitis, testa monophylla, in medio ossa, margine cartilagineo scabro, naribus tubulosis. Bonat. Erpet. p. 25. tab. 5. fig. 3. — Lacép. quadr. ovip. p. 136. excl. syn. Boddaert. (*Trion aegyptiacus*.)*) — La tortue molle Latr. rept. I. 164 II. 291.

*) *testudo verrucosa* Bartr.

The great soft shelled Tortoise Bartram Travels through North and South Carolina. Philadelphia 1794. p. 175. tab. 4. 5. — Magaz. d. Reisebeschr. 10 Bd. p. 172. c. fig.

Quem auctorem omnes secuti sunt.

Chelys spec. nov. Geoffr. annal. du mus. d'hist. nat. Tom. XIV. p. 18.

Testudo Bartrami, cartilaginea, mollis, pedibus digitatis, digitis quinque unguiculatis, naso elevato, maxilla inferiore cirrhosa, cirrhis retractilibus. Dand. rept. II. p. 74.

Testudo verrucosa. Schoepf. test. p. 90.

§. 2.

Spec. 2. *Trionyx aegyptiacus* Geoffr.

1. Animal adultum, siccum.

Truncus orbicularis, superne convexus, discus offens

*) In parenthesi addimus nomina specierum, ad quas perperam citatae pertinent.

ovatus, lineis longitudinalibus scaber, crista tuberculosa humili supra vertebrae: sternum laeve, quatuor in locis scabriusculum: appendices subparallelae.

Trionyx aegyptiacus. Quatre callosités: carapace peu convexe: les deux appendices antérieurs très écartés l'un de l'autre et parallèles. Geoffr. annal. du mus. XIV. p. 12. c. fig. viv. anim. et testae cum sterno.

Testudo triunguis Forsk. faun. arab. pag. 9. — Gmel. syst. nat. 1039. — La tortue tirse Bonat. Erpet. p. 21.

2. pullus maior.

Truncus ovalis, demisse convexus, lineis elevatis longitudinalibus, quarum duae vertebrales carinam spuriam constituunt.

a) *Trionyx* a Boddaerto descriptus.

Testudo cartilaginea Schloff. pedibus palmatis, testa lanceolata planiuscula, naso elongato. Boddaert epist. de testudine cartilaginea. Amstel. 1770. p. 21. c. fig. — Schneid. Samml. verm. zool. Abhandl. p. 312. — Donndorfs Zool. Beytr. III. p. 16.

Testudo cartilaginea, testa orbiculari, membranacea, in dorso striata, pedum unguibus tribus, naso cylindrico prolongato. Boddaert Schrift. der Berl. Gesells. naturf. Fr. III. p. 265. — Gmel. syst. nat. 1039. — Bechst. Ueberf. der Lacep. Naturg. I. 280.

Testudo Boddaerti, testa orbiculari membranacea, striata in dorso, pedum anteriorum et posteriorum palmatorum unguibus ternis, naso cylindrico prolongato. Schneid. I. Beytr. z. Schildkr. p. 9. c. fig. — Schneid. Leipz. Magaz. zur Naturg. u. Oecon. 1786. 3 St. p. 263. tab. 2. — Schneid. Schrift. d. Berl. Gesells. naturf. Fr. IV. B. 3. St. p. 267.

Trionyx stellatus. Cinq étoiles sur la partie postérieure de la carapace. Geoffr. annal. du mus. d'hist. nat. Tom. XIV. p. 13. ex ipso specimine, quo usus Boddaert. Neque tamen specie diversum crederem, quod jam capite antecedenti §. I. expositum est.

b) *Trionyx* a Thunbergio descriptus.

Testudo rostrata, pedibus palmatis, testa integra carinata, elevato-striata, scabra Thunb. nov. act. acad. succ. Vol. VIII. p. 172. c. fig.

Quoad figuram testudini Boddaerti simillima. De ararum structura nil monuit cel. vir.

3. pullus minor.

truncus orbicularis, demisse carinatus, lineis longitudinalibus tuberculosis, margine flaccido.

Testudo rostrata Thunb. Testa orbiculari, ovata, monophylla, coriacea, carinata, rugis obliquis e punctis elevatis striata, scabra Schoepf. test. p. 93. tab. 20. — Daud. rept. II. 77. — Tortue à bec Latr. rept. I. 169. II. 291. — *Testudo ferox*, var. Shaw Gen. Zool. p. 67. tab. 17.

4. pullus primae aetatis.

Testudo membranacea, pedibus palmatis, unguiculis tribus, testa orbiculari ovata, membranacea, grisea, scabra. Blumenb. Anfangsgr. der Naturg. — Schneid. Schildkr. p. XLVI et 45. tab. 2. (fig. mala, quod jam observat Schoepf. ex specimine, quo usus Schneid. hist. test. p. 95.) — Gmel. syst. nat. 1039. — Dondorf. Zool. Beytr. III. 278.

§. 3.

Spec. 3. *Trionyx euphraticus* Oliv.

Testudo euphratica. Olivier voyage en Perse III. p. 453. tab. 41. Margo testae anterior male tanquam offcus depictus.

Trionyx euphraticus. Sans callosités: queue dépassant l'extrémité de la carapace Geoffr. annal. du mus. d'hist. nat. XIV. p. 17.

Testudo euphratica, lorica dorsali viridi-obscura, coriacea, margine non tuberculoso, sterno albido, laevi Daud. rept. II. 305. ex litt. Oliv.

§. 4.

Spec. 4. *Trionyx javanicus*.

Trionyx javanicus. Deux callosités, carapace convexe et renflée latéralement: appendices antérieurs contigus à leur base. Geoffr. annal. du mus. d'hist. nat. Tom. XIV. p. 15. c. fig. senti et sterni.

§. 5.

Spec. 5. *Trionyx Brongniarti*.

Trionyx carinatus. Quatre callosités: carapace convexe, de primée latéralement et saillante au dessus de la colonne épinière. Geoffr. Annal. du mus. d'hist. nat. Tom. XIV. p. 14.

Obf. Synonyma ab ill. Geoffroy allata hic non pertinere videntur. Figurae nimirum Trion. Boddaerti, rostratae Thunb. rostratae Schoepf. et membranaceae Blumenb. inter se adeo similes sunt, ut, usque dum arcarum structura innotescat, disjungi non possint. Nil certi de harum specierum natura statui potest, nisi ex autopsia speciminum, quibus utebantur cel. viri. Ceterum quoque ill. Thunberg certior me fecit, se testudinem rostratam Schoepfii eandem habere ac propriam.

§. 6.

Spec. 6. *Trionyx granosus* Schoepf.

Testudo granosa, testae orbiculatae siccae discus interior ossis punctatusque. Schoepf. list. test. p. 148. c.

descr. variet. p. 153. tab. 30. A, B. fig. optim. excl. fyn.
Forsk. et Gmel. (Trion. aegyptiaci.) — Testudo gran-
nulata Daud. rept. II. 81.

Trionyx Coromandelicus. Sept callosités au
plastron. Geoffr. Annal. du mus. d'hist. nat. Tom. XIV.
p. 16. c. fig. specim. Lacep.

Testudo punctata (tortue chagrinée) disco
osseo punctatoque. Lacep. quadr. ovip. p. 171. tab. II.
fig. pulli ex itinere Sonnerat. proventi. — Schneid. 2.
Beytr. z. Schildkr. p. 22. fig. Lacep. — Test. scabra
Latr. rept. I. 164. II. 290. — Testudo granulata
(Chagrin Tortoise) Shaw Gen. Zool. III. pag. 68.
tab. 14. fig. Lacep.

Testudo nova. Sonnerat voyage aux Ind. orient.

(Die Fortsetzung folgt im nächsten Stücke.)

Verbesserungen

der im II. Stücke dieses Archivs abgedruckten Abhand-
lung über den Planeten Saturn u. s. w.

S. 126. Z. 14.	für	18'',72	l. m.	18'',78
— 146. — 22. —		372000''	—	972000''
— 149. — 15. —		11 ^U 58'40''	—	10 ^U 58'40''
— 169. — 4. —		215°35'47''	—	215°45'47''
— 170. — 12. —		230°15'29''	—	230°18'29''

Prodromi monographiae Cheloniorum
conclusio. Auctore Schweigger.

§. 7.*)

Spec. I. Chelonia coriacea Linn.

α. Adulta, cristis longitudinalibus repando-dentatis.

Test. coriacea (coriaceous Turtle) fusca, subtus pallidior, testa coriacea, costis quinque longitudinalibus fulcatis, Shaw gen. Zool. III. p. 77. tab. 21. bona.

Test. coriacea, corpore coriaceo, non scutato, per longitudinem striato, pedibus pinniformibus, Daud. rept. II. p. 62. c. fig. mediocri.

Test. coriacea, testa coriacea, per longitudinem striata, Schoepf. test. p. 123.

*) Ordinem prioris libelli nos et hic secutos esse vix est quod monemus. In enarrandis enim scriptoribus ad antiquiores descendimus a recentioribus: deinde ad quasnam species synonyma exclusa pertineant, in parenthesi notavimus, et ad calcem auctorum praestantiorum eos adiecimus, qui istis tantum ducibus utebantur, non ipsi autoptae. Similiter in fine §. §. citavimus, qui descriptiones mancas cum malis figuris exhibuerunt, nisi quos prorsus negligendos duxerimus. In Donnerdorffii libro (Zoologische Beyträge. Leipzig 1798.) ad essentialia solum respeximus, quum iusto maiori abundet synonymorum numero. Qui denique libri uncinis inclusi leguntur, eorum inspicendorum copia nobis adhuc non fuit.

Prodromi monographiae Cheloniorum
conclusio. Auctore Schweigger.

§. 7.*)

Spec. I. Chelonia coriacea Linn.

α. Adulta, cristis longitudinalibus repando-dentatis.

Test. coriacea (coriaceous Turtle) fusca, subtus pallior, testa coriacea, costis quinque longitudinalibus fulcatis, Shaw gen. Zool. III. p. 77. tab. 21. bona.

Test. coriacea, corpore coriaceo, non scutato, per longitudinem striato, pedibus pinniformibus, Daud. rept. II. p. 62. c. fig. mediocri.

Test. coriacea, testa coriacea, per longitudinem striata, Schoepf. test. p. 123.

*) Ordinem prioris libelli nos et hic secutos esse vix est quod monemus. In enarrandis enim scriptoribus ad antiquiores descendimus a recentioribus: deinde ad quasnam species synonyma exclusa pertineant, in parenthesi notavimus, et ad calcem auctorum praestantiorum eos adiecimus, qui istis tantum ducibus utebantur, non ipsi autoptae. Similiter in fine §. §. citavimus, qui descriptiones mancas cum malis figuris exhibuerunt, nisi quos prorsus negligendos duxerimus. In Donnerdorffii libro (Zoologische Beyträge. Leipzig 1798.) ad essentialia solum respeximus, quum iusto maiori abundet synonymorum numero. Qui denique libri uncinis inclusi leguntur, eorum inspicendorum copia nobis adhuc non fuit.

Test. Lyra, (la tortue Luth.) testa coriacea, longitudinaliter 5-striata. Lacep. quadr. ovip. I. p. 111. c. fig. bona. — Bechst. Uebersetz. p. 135. — Bonat. Erpet. p. 22. c. fig. Lacep. — Latr. rept. I. 58. II. 278. — Donnd. Zool. Beyträge III. 2.

Tortue. Amoureux in Roziér Journ. de Phys. 1778. Janvr. p. 65. et Suppl. B. p. 230.

Coriaceous Tortoise Penn. Brit. Zool. III. p. 7. tab. I.

(Testudo. Roncalli censura medicinae enormiter dispendiosae, immo mortiferae. 1768 p. 731. c. fig.)

Tortue Fougereux hist. de l'acad. 1765. p. 44.

Test. coriacea, pedibus pinniformibus muticis, testa coriacea, cauda angulis septem exarata. Linn. syst. nat. XII. p. 350. — Schneid. Schildkr. p. 312. — Zweyter Beytr. p. 29. — Gmel. syst. nat. 1036.

(Testudo coriacea Vandelli ad Linneum. Patav. 1761. c. fig.)

Tortue de la Font. mem. de l'acad. des scienc. 1729. p. 8.

(Turtle. Borlase Cornwall. p. 285. tab. 27. dit. a Pennant.)

Test. coriacea f. Mercurii. Rondel. pisc. marin. XVI. Cap. 4. c. fig. pessima. — Geoff. aquat. 946.

(Comment. Acad. scienc. Bonon. IV. 17.)

(Memorie per servire all' istoria litteraria. Venez. 1756. VII. artic. 7. p. 17. c. fig.)

Rat de mer. Tortue à clin. (Gall.) Trunk Turtle (Angl.) Lederchild. (Germ.)

β. Pullus, cristis longitudinalibus tuberculatis.

Test. coriacea jun. Schoepf. test. tab. 29. — Shaw gen. Zool. III. p. 77.

Test. tuberculata Penn. Philof. Trans. Vol. 61 Pars I. n. 32. p. 266. tab. 10. — Journ. de phys. Tom. XIII. p. 230—234 — Schneid. Schildkr. p. 316.

§. 8.

Spec. 2. *Chelonia japonica* Thunb.

Test. japonica, pedibus pinniformibus, uniungiculatis, testa carinata crenata postica quadriloba. Thunb. act. suec. VIII. p. 178. tab. 7. fig. 1. — Schneid. Schrift. d. Berl. Ges. naturf. Fr. X. 3 St. p. 266. — Bechst. Naturg. Lacep. I. 275. c. fig. Thung.

Species ab unico Thunbergio visa.

§. 9.

Spec. 3. *Chelonia imbricata* L.

α. unguibus palmarum plantarumque solitariis aut binis.

Testudo imbricata, variegata, scutellis disci imbricatis tredecim. Shaw gen. Zool. III. p. 89 tab. 26 et 27.

Testudo Caretta, scutis dorsalibus tredecim imbricatis, testa elliptica subcarinata ferrata. Daud. rept. II. p. 39. excl. var. β. quae Ch. virgata Dumer.

Testudo imbricata, testa elliptica subcarinata ferrata, scutellis disci imbricatim laxo incumbentibus. Schoepf. test. p. 83. tab. 18. A et B. — Donnd. Beytr. III. p. 3. excl. syn. Bruce it. (tab. 42. fig. Ch. virgatac.) — Le Caret Latr. rept. I. 50. II. 278.

Testudo Caretta, squamis disci imbricatis. Lacep. quadr. I. 105. excl. syn. Bont. de quo infra. — Bechst. Ueberf. p. 124.

Testudo imbricata pedibus pinniformibus, testa cordata subcarinata ferrata, scutellis imbricatis, cauda squamata L. syst. nat. XII. p. 350. n. 2. excl. syn. Bont. (test. squamosa, quae Manis potius quam testudo.)

Testudo pedibus pinniformibus, testa cordata subcarinata, margine ferrato, scutellis imbricatis latiusculis. Gronov. Zoophyl. p. 16. n. 72.

Testudo marina americana. Seb. thes. I. tab. 80. fig. 9. a Linneo ad Ch. Mydas et ad Caouanam citata.

Caret. du Tertre. Antill. II. p. 229.

Scaled Tortoise. Mus. Grew p. 38. tab. 3. fig. 4. a Linn. ad Ch. Mydas relata. — Test. squamosa Raj. syn. anim. p. 260.

Bec a faucon, Dampier voyage autour du monde. I. 135 sq.

Test. *Caretta*. Rochef. hist. des Antill. I. 248.

(Caret. Labat voyage aux isles de l'Amérique I. 182 et 311.)

Caret. Fermin hist. de la Holl. équin. p. 50.

β . unguibus palmarum plantarumque quatuor. Varietas nunquam a me visa.

Test. imbricata, unguibus palmarum plantarumque quaternis, scutis laxae atque imbricatim incumbentibus. Schneid. test. p. 309. Leipz. Magaz. z. Nat. 1786. St. 3. p. 258. — Gmel. syst. nat. 1036.

Test. *Caretta*. Bonat. Erpet. p. 21. tab. 4. fig. 1.

La tuilée Daubent. dict. encyclop.

Hawksbill Turtle unguibus utrinque quatuor Brown Jam. p. 465. n. 1.

Test. *Caretta* Knorr del. nat. II. 124. tab. 50.

γ. scutellis disci quindecim.

Varietas admodum dubia.

The Hawksbill Turtle Catesby nat. hist. of Carol. II. p. 39. tab. 39. a Linneo ad Caouanam citata. Figura pessima.

Test. Caretta Raj. syn. anim. p. 258. Vix mera Ch. imbricatae descriptio sed notas Caouanae immiscuisse auctorem crederem.

δ. Caput huius speciei adultae descripsit Wallbaum sub nomine:

Test. rostro gallinaceo. Chelonogr. p. 126. idque synonymum vulgo ad Ch. Mydas refertur, at male, mandibulae enim edentulae dicuntur, quae in Ch. Mydas acute serratae.

ε. pullus.

Schoepf. hist. test. p. 72. tab. 17. fig. 1.

Test. imbricata Wallb. Chelon. p. 110.

? Test. rugosa Van Ernest. squamis trijugis, rugis transversalibus atris, colore castaneo, margine flavescente Daud. rept. II. p. 37.

Observ. Pullus e mari indico, 9 poll. longus, 7 poll. latus, 3 poll. altus. Testa castanea, luteo marginata, rugis 3 nigris et transversalibus in unoquoque scutello sternum viridi-fuscum. Pedes pinniformes, luteo-variegati, anteriores unguibus tribus, posteriores unguibus quatuor. — Sic Van. Ernest. in litt.: qui autem characteres ad speciem rite stabiliendam neutiquam sufficiunt. Testa enim pullorum Cheloniarum post mortem saepissime rugosa.

Karet - Schildkroete. Habichtsfchnabel. Schuppen-

fchild. (Germ.) Bec à faucon (Gall.) Hawksbill Turtle (Angl.).

§. 10.

Spec. 4. *Chelonia virgata* Dumer.

in mus. par.

Test. semimembranacea. Herrn. observ. zool. ed. Hammer. p. 219. Vidi specimen cel. auctoris Argentorati, testam nimirum juniorem et inde interstitiis costarum majori ex parte cartilagineis.

Test. *Caretta* g. Daud. rept. II. p. 48. Vidi specimen auct. in mus. parif.

Testudo *Caretta* Bruce voyage en Abyssi. Trad. franç. Vol. V. p. 252. tab. 42.

„Testa 3 ped. 7 poll. longa. Scutella non imbricata, lateo radiata, rectilinea: artificibus inserviunt. Caro ingrati saporis. Habitat in mari rubro. — Figura accuratissima.“ Bruce.

Figura, *Ch. virgatae* alioquin simillima, his tamen notis recedit: scutellis capitis subaequalibus, pedibus inermibus et scutello testae marginali antico angusto, quod latissimum in omnibus cheloniarum speciminibus, quae vidi, errorem in icone commissum esse opinor. — Figura vulgo pro *Ch. imbr.* habetur.

Testa *Ch. virgatae* in juniore aetate ovato-cordata, et tunc colore tantum haec species a *Ch. Mydas* distinguitur, alioquin capitis et totius corporis structura ejus simillima; in proVectiori aetate testa suborbicularis.

? Test. *Jurucujae* var. Marcgr. hist. natur. Brasil. p. 241. — Raj. syn. anim. p. 256.

§. II.

Spec. 5. *Chelonia Mydas* L.

a. testa viridi - fusca, scutellis disci tredecim, unguibus solitariis aut binis.

Testudo Mydas, (Green-Turtle), testa subfusca, scutellis disci tredecim. Shaw Gen. Zool. p. 80. tab. 22. excl. syn. Wallb. (*Ch. imbricata*).

Test. *Mydas*, (Tortue franche), scutis non imbricatis nec carinatis, scutellis tredecim dorsalibus, pinnis anticis binnguiculatis. Daud. rept. II. p. 10. excl. syn. Seb. (tab. 80. fig. 9. *Ch. imbricatae*); Gessner. et amoen. acad. I. p. 138. n. 22. (de quibus infra) Aldrov. quadr. (tab. 714. *Ch. Caouanae* imago), denique Olear. mus. (tab. 17. *Ch. Caouana*?)

Test. *Mydas*. Bonat. Erpet. p. 19. tab. 3. fig. 2.

Test. marina vulgaris, unguibus acutis, plantarum solitariis. Lacep. quadr. ovip. I. p. 54. tab. I. excl. syn. Gessn. et Olear., de quibus posthac. — Bechsf. Ueberf. I. p. 66.

Test. viridis, Schneid. Schildkr. p. 299. — Test. *Mydas*. Gmel. syst. nat. 1037. excl. syn. Gessn. Aldrov. Olear. et Seb. tab. 80. fig. 9. Eisdem auctores, imprimisque Schoepfium secutus est Donndorf in Zool. Beytr. III. p. 7. excl. var. a. Wallb. (*Ch. imbricata*).

Test. *Mydas*, pedibus pinniformibus, unguibus palmarum binis, plantarum solitariis, testa ovata L. syst. nat. XII. p. 350. excl. syn. amoen. acad. (I. p. 138. n. 22, definitio *Ch. Mydas*, descriptio *Caouanae*) nec non Aldrov. (qui de *Caouana*. agit.) Gessn.*). Olear. (de

*) *Cheloniarum* imagines tres exstant in Gessn. anim. Libr. IV. edit. Tigur. 1558, prima sub nomine test. coricatae Rondel.

Ch. Caouana) et Seb. (I. tab. 80. fig. 9. Ch. imbricatae.)

Testudo. Amoen. acad. I. p. 137. n. 21. excl. syn. Seb. (tab. 80. fig. 1. test. graeca, ab auctore Mydas appellata. Eundem locum Linnaeus retulit ad test. carolinam, nec tamen meliori jure.)

Testudo unguibus solitariis acuminatis, rostro obtuso, testa ovata ferrata, dorso carinato brevi. Gronov. Zoophyl. p. 16. n. 70.

Testudo pedibus natatoriis, unguibus acuminatis, palmarum plantarumque unico. Gronov. mus. ichthyol. II. p. 85. n. 68. excl. syn. Seb. (tab. 80. fig. 9. Ch. imbricatae.)

The green Turtle, unguibus palmarum binis, plantarum singularibus. Brown. hist. of Jam. p. 465. n. 2.

Testudo marina vulgaris. Fermin. hist. de la Holl. équin. p. 17.

Testudo vulgaris. Klein quadr. dispos. p. 99.

Test. marina vulgaris. Raj. syn. anim. p. 254.

Test. Jurucuja, Lusitanis Tartaruga: Marcgr. hist. Brasil. p. 241. — Raj. syn. anim. p. 256. (Haud confundenda est cum test. Jurucuja Seb. thes. quae lutaria.)

Test. marina. Rochefort hist. des Antill. I. p. 246. excl. fig. quae Ch. Caouanae similior est aut forsitan Cheloniae Mydas scutellis disci quindecim mala imago.

(Test. marina. Bradley natur. tab. 4. fig. 4.)

♀. testa viridi, scutellis disci tredecim.

est Caouanae effigies, secunda Ch. coriaceae, tertia omnino monstrosa et fabulosa, repetita in Thierbuch p. 179 et in Jonstoni theatr. univ. anim. tab. 80. Descriptiones quas dedit Gessner in omnes fere chelonias quadrant.

Testudo viridi-squamosa, (la tortue à ecaille verte) squamis testae superioris viridibus. Lacep. quadr. ovip. p. 92. Bechst. Ueberf. p. 107. — Test. viridi-squamosa Bonat. Erpet. p. 20. — Test. Mydas β . viridis. Latr. rept. I. 48. II. 278. — Test. Mydas. Daud. rept. II. p. 11. — Green Shelled Turtle Shaw gen. Zool. III. p. 94.

Tortue verte. Tortue des amazones. Bomare dict. d'hist. nat.

Test. viridis var. Dampier voy. autour du monde. I. 139.

Hisce auctoribus (Bomare et Dampier) usus est ill. Lacepede, neque ipse hanc testudinem vidit, quae aut varietas aut ne varietas quidem videtur.

γ . scutellis disci quindecim.

Rarissima varietas, cujus specimen in museo parisiensi servatur. — Lacep. quadr. ovip. I. p. 58.

Test. atra L. amoen. acad. I. p. 284. Descr. pulli.

The green Turtle Catesby nat. hist. of Carol. II. p. 38. tab. 38. fig. mala.

Eadem forsitan:

Test. Gigas. Wallbaum. Schrift. der Berl. Gesellschaft naturf. Fr. XI. 248. et Neue Schrift. der Gesellschaft naturf. Fr. I. 630. — Descriptionem repetiit Bechstein in Uebersetz. d. Naturg. Lacep. I. 266. et test. Gigas veram Carettam L. esse contendit, sed hoc vix credendum, quum Wallbaum Carettam adultam bene noverit, idquod ex Chelonographia satis liquet. Scutella disci in testa Ch. Gigas numero quindecim dicuntur, sed plana sunt et pedes unguibus binis armati, quales saepius in Ch. Mydas inveniuntur. Descriptio, quam dedit Wallbaum, copiosa est, at ingrata Minerva facta.

β. Caput Ch. Mydas adultae et testam descripsit

Wallbaum sub nominibus:

Testudo marina rostro anserino. Chelonogr. p. 82. et 124. — Mandibulae acute serratae.

Testudinis marinae scutum ingens. Chelonogr. p. 88. et 127.

γ. Pullus.

Pedes in pullis ut plurimum uniungiculati, nasus tuberculatus, maxillae vix serratae, bracteae sedecim aut plures verticem et genas occupant. Ceterum pulli variant, nimirum:

a) atri, testa demissa carinata.

Testudo Mydas Schoepf. test. p. 73. (optima synonymorum explicatio) tab. 17. fig. 2.

Testudo cepediana, pedibus pinniformibus, ungue unico munitis, quatuordecim lamellis sternalibus. Dand. rept. II. p. 50. tab. 17.

Obs. Vidi in museo parisiensi pullum Ch. Mydas scutello sternali impari antico subbisido, et sic lamellis 14. Quae de test. cepediana allata sunt optime in hoc specimen quadrant, quod idem credo, quo usus Daudin, nullo modo autem a Ch. Mydas diversum.

Testudo macropas. Wallb. chelonogr. p. 112. — Test. Mydas var. Bechst. in Lacep. Naturg. I. 261. — Donnd. Zool. Beytr. III. p. 11.

Testudo unguibus acuminatis, palmarum plantarumque solitariis. L. amoen. acad. I. 284. Pullus scutellis disci quindecim, quem jam sub. γ. citavimus.

Testudo atra L. mus. Adolph. Frider. p. 50. excl. syn. Grew (Ch. imbricatae.)

Testudinis marinae pullus. Seb. thes. I. tab. 79. fig. 5.

b) atri, testa tricarinata.

Vidi plura specimina huius varietatis, pullis *Ch. Mydas* aliòquin adeo simillima, ut specie diversa censere non possim. Sexa forsitan differunt.

Testudinis marinae pullus. Seb. test. I. tab. 79. fig. 4.

Neque alia species videtur:

Testudo nasicornis, (la tortue nasicorne), naso tuberculato, instar cornu elevato. Laccp. quadr. ovip. I. p. 103. excl. syn. Gronov. (qui de *Ch. Caouana* loquitur, cuius pulli nasus similiter tuberculatus.) — Bechst. Ueberf. I. 122. — Batr. rept. I. 57. II. 278. — Test. imbricatae var. Schoepf. test. p. 75 et 89. — Test. Caouanae pullus. Daud. rept. II. 54. — Rhinoceros Turtle Shaw gen. Zool. III. 95.

III. Lacepède test. nasicornem *Cheloniae Mydas* affinem dicit, sed omnino eadem est, si figura, quam dedit Bonaterre, huc pertineat.

Testudo nasicornis, pedibus pinniformibus, testa ovata, margine serrato, scutellis lateralibus tuberculatis, unguibus palmarum plantarumque binis acuminatis, naso quasi cornuto. Bonat. Erpet. p. 21. tab. 3. fig. 3. (ex Edw. av.) excl. syn. Gronov. (*Ch. Caouana*.)

Testudinis marinae pullus, (Hawksbill Turtle?) Edw. av. tab. 206. fig. 1. et fig. 2. monstri, capitibus 2. — Testa leviter convexa, subtricarinata, scutellis rectilineis. Discus cum sterno bracteis tredecim obtectus. Nasus protractus acutus. Pedes uniunguiculati.

c) testa

c) testa cinereo-fusca.

Vidi pullum tonerrinae aetatis ita conformatum in museo Parisiensi.

Testudinis marinae pullus. Seb. I. tab. 79. fig. 6. — Scutellis nigris et albis: an non singulis bracteis demissis?

? Testudo alba Schlofferi, pedibus pinniformibus, testa plana coriacea alba, cauda granulata obtusa. Boddaert de test. cartilag. p. 15. — Schneid. Sammlung verm. zool. Abhandl. p. 310.

Pullus a solo Boddaerto visus, longitudinis 2 poll. 11 lin. Maxilla inferior hamata, apice in fossula palati recondendo. Scutella disci 13, regularia, carina continua. Testa humilis. Pedes uniungiculati, in pagina superiori fusco-testacei, in inferiori pallidiores. Corpus album. Licet his aliisque notis a cel. viro allatis testudo alba Cheloniae Mydas maxime affinis videatur, tamen sternum bracteis duodecim obtectum esse contendit, quem numerum in Ch. Mydas nunquam observavi. Minoris momenti censeo, scutella capitis sedecim dixisse, id enim de vertice et genis tantum intelligendum videtur, necque denominationi Test. albae tantam auctoritatem tribuerem, ut novam eam speciem haberem. Accedit quod cel. Boddaert testudines marinas non bene novit. Ita p. 13 de Ch. imbricata sub falso nomine Test. Carettae L. loquitur; p. 11. testudinibus marinis plerumque testam imbricatam esse contendit, et scutella lanceolata vel pentagona: male adfert denique test. graecae figuram: Seb. thes. tab. 80. fig. 1.

Riesenschildkroete (Germ.) Common green turtle.
Archiv für Naturwissensch. IV. St. D d

Esculent turtle (Angl.) Tortue verte. Tortue franche.
(Gall.)

§. 12.

Spec. 6. *Chelonia Caouana* Lacep.

a. testa ovato-cordata.

Test. *Caretta* (Loggerhead turtle) variegata, scutellis dorsalibus quindecim, intermediis posticis gibbis. Shaw gen. Zool. III. p. 85. tab. 23. 24 (fig. Gottwald.) et 25. (fig. Aldrovand.)

Test. *Caouana*, testa ovato-cordata, ferrata, scutis disci quindecim, vertebralibus postice gibbis. Schoepf. hist. test. p. 67. tab. 16. — Dand. rept. II. p. 54. excl. syn. Wallb. (test. macropus, quae pullus Ch. *Mydas*.) et Lacep. (test. nasicornis, pullus Ch. *Mydas*) — Test. *Caretta* Domnd. zool. Beytr. III. p. 9. excl. test. nasicorni Lacep.

Test. *Caretta*, testa ferrata, scutellis disci quindecim, naso non tuberculoso Latr. rept. I. 53. II. 278.

Test. *Caouana*, pedibus pinniformibus, testa ovata, margine ferrato, scutellis mediis postice acutis, unguibus plantarum palmarumque binis. Bonat. Erpet. p. 20.

Test. *Caouana* (la Caouane), unguibus acutis, plantarum binis. Lacep. quadr. ovip. I. p. 93. — Bechst. Ueberf. I. p. 110.

Test. *Cephalo*, scutis dorsalibus postice gibbis, unguibus palmarum plantarumque binis. Schneid. Schildkr. p. 303. — Test. *Caretta* Gmel. syst. nat. p. 1038. excl. syn. Catesby (tab. 39. Ch. *imbricatae*).

Test. *Caretta*. Wallb. Chelonogr. pag. 4 et 95. excl. syn. Brown (hist. of Jam. qui de Ch. *imbricata* agit) et Catesby tab. 39. (fig. Ch. *imbricatae*.)

Test. Caretta, pedibus pinniformibus, unguibus palmarum plantarumque binis, testa ovata, acute serrata Linn. syst. nat. XII. p. 351. n. 4. excl. syn. Seb. (tab. 80. fig. 9.) et Catesby tab. 39. (Ch. imbricatae imagines.)

Testudo pedibus pinniformibus, unguibus acuminatis geminis, rostro acuminato, testa ovata serrata, dorso tuberculoso. Gronov. Zool. phyl. p. 71. excl. syn. Edw. (hist. of birds tab. 206. fig. Ch. Mydas (et mus. Grew. (Ch. imbricata.)

The Loggerhead turtle, unguibus utrinque binis, acutis, squamis dorsi quinque gibbis. Brown jamaic. p. 465. n. 3.

Test. marina. Gottwald Schildkr. fig. 1. 2. et 3. Partes internas exhibent fig. 4 — 11.

Caret. Diction. encyclop. Vol. 2. tab. 25. fig. 2.

Testuggine di mare. Cetti Storia di Sardegna. III. p. 12.

The Loggerhead Turtle. Catesby nat. hist. II. p. 40. descr. vix. figura, de qua infra sub 7.

Meer-Schildkroete. Meyer Zeitvertr. I. tab. 30 et 31.

[Caouane. Labat voyage aux isles de l'Amerique. I. p. 182 et 311.]

Test. marina. Mus. Besler. p. 61. tab. 16.

La grosse tortue ou tortue à bahut, magna, testa convexa rotundata, carne nigra. Dampier voyage autour du monde. I. 134.

Tortue à grosse tête, capite magno, carne nigra. Dampier voy. aut. du monde. I. p. 135.

Test. Caouana Roches. hist. nat. des Antill. p. 248. fig. 246. — Raj. syn. anim. p. 257.

D d - 2

Kaouane. du Tertre hist. nat. des Antill. II. p. 228.

Test. corticata Rondel. de pisc. marin. Lib. XVI Cap. 3. — Geoff. hist. anim. quadr. p. 78 a Linneo ad Ch. Mydas citata.

In Antillis Caouanos et Juruca appellatur Bomaré dict. d'hist. nat.

His accedunt synonyma quaedam, a Linneo ad Ch. Mydas relata:

Testudo. amoen. acad. I. p. 138. n. 22. Ch. Caouanae descriptio cum definitione Ch. Mydas. Exclud. syn. Seb. (tab. 80. fig. 9.) et Grew. mus. (tab. 3. fig. 4) quae ad Ch. imbricatam pertineat.

Test. marina. Aldrov. quadr. ovip. p. 712. tab. 714

Test. marina. Olear. mus. p. 27. tab. 17. fig. 1. quae pessima.

β. testa suborbiculari.

Figuram dedit Schoepf. hist. test. p. 71. tab. 16. B. Huiusmodi varietas etiam in museo Parisiensi servatur.

γ. varietas scuto convexiori.

Test. arcuata (the trunk turtle) Catesby II. p. 40. tab. 40. — Shaw. gen. Zool. III. p. 95. — Tortue coffre. Daud. rept. II. p. 61.

Figura mala, cui vix fides habenda.

δ. testa ferruginea, fasciis duabus transversalibus fuscis.

Descriptionem dedit Daud. rept. II. p. 58.

ε. testa variegata, scutellis dorsi difformibus.

Test. Caretta var. Wallb. Chelonogr. p. 101.

ζ. palmarum unguibus tribus, plantarum duobus. Daud. rept. II. p. 60.

(Color testae et unguinum numerus saepius variant.)

». Pullus.

Shaw gen. Zool. III. tab. 11.

Schoepf. hist. test. p. 84. tab. 17.

The mediterranean tortoise. Pet. Brown
new illustr. of Zool. tab. 48. fig. 3.

§. 13.

Spec. 2. *Chelydra serpentina* L.

Test. *serpentina*. Bosc. nouv. dict. d'hist. nat.
Vol. 22. p. 261.

Test. *serpentina*, scutis dorsalibus postice sub-
carinatis, lorica dorsali postice quinque aut sexdentata,
pedibus digitatis. Daud. rept. II. p. 98.

Test. *serpentina*, testa flexili, scutellis rugoso-
radiatis, margine postico quinquies serrato, sterno angu-
sto cruciformi. Bosc. in Latr. hist. nat. des rept. I. 159.
II. 290. excl. syn. (E. Spengleri.)

Test. *serpentina*, testa ovali depresso, trifariam
convexa, squamis acuminatis, margine postico rotundato,
acute serrato. Schoepf. test. p. 28. tab. 6. — Deser. re-
petit Bechst. in Lacep. Naturg. I. 172. — Snake tortoise.
Shaw. gen. Zool. III. p. 72. tab. 19. — Donndorff. zool.
Beytr. III. p. 23.

Test. *serpentina*, pedibus digitatis, testa subca-
rinata, postice obtusa, acute quinque dentata L. mus.
Adolph. Frider. II. p. 36. — Gmel. syst. nat. 1042. (Pa-
tria: China et Algeria. — ?) — Bonat. Erpet. p. 28. n.
20. — Lacep. quadr. ovip. I. 131. — Schneid. Schildkr.
p. 337.

(Test. serrata. Penn. Suppl. arctic. zool. p. 79.)

Snapping Turtle Novaboracenſibus. Schoepf
Reiſe ins nördl. Amer. I. p. 386.

Alligator tortoiſe Carolinenſibus. Hoſc.

§. 14

Spec. I. *Chelys fimbriata* Schneid.

Teſt. fimbriata (fimbriated tortoiſe) Shaw. gen.
Zool. III. p. 70. tab. 18. excl. ſyn. Linn. (E. ſcorpioidea.)

Teſt. Matamata, pedibus ſubdigitatis, naſo cy-
lindrico proboscideo, collo utrinque fimbriato, teſta ovali
ſubconvexa, trifariam carinata. Daud. rept. II. p. 86.

Teſt. fimbriata, teſta ovali depreſſa, pone
angultiore integra, trifariam convexa, ſquamis acuminat-
is, ſterno obovato, acute emarginato. Schoepf. teſt. p.
97. tab. 21. excl. ſyn. Lacep. Bonat. et Linn. (E. ſcorpio-
idea. — Teſt. Matamata. Latr. rept. I. 94. II. 281. —
Donnd. zool. Beytr. III. 24.

Teſt. Matamata, teſta ovali ſubconvexa, trifa-
riam carinata, pedibus ſubdigitatis, naſo cylindrico pro-
boſcideo, collo utrinque fimbriato. Brugnière Journ.
d'hiſt. nat. n. 7. Paris 1792. p. 253. tab. 13. — Bechſt.
Ueberſ. der Naturg. Lacep. I. p. 338.

Teſtudo fimbriata, teſta ſtriata et echinata,
fronte calloſa triloba. Schneid. Schildkr. p. 349. excl.
ſyn. L. (E. ſcorpioidea.) — Gmel. ſyſt. nat. 1043.

Teſtudo terreſtris major, putamine echinato
et ſtriato. Barrere hiſt. de la france equinoct. p. 60. —
Fermin deſcr. de Surin. H. p. 226.

Teſt. Raparapa. Fermin hiſt. nat. de la Holl.
equin. p. 51.

(?Teſt. cornifera Rondel. citat. a Barrere.)

§. 15.

Spec. 2. *Emys scripta* Schoepf.

Test. scripta, testa orbiculari depresso, scutellis omnibus superne characteribus notatis, marginis viginti quinque, inferne guttatis. Schoepf. hist. test. p. 16. tab. 3. fig. 4 et 5. (Margo sterni posticus male delineatus est; nam bifidus, non truncatus.) — Lettered tortoise Shaw gen. Zool. III. p. 56. tab. 12. descr. et fig. Schoepf. — Daud. rept. II. 140. — Bechst. Ueberf. der Naturg. Lacép. I. p. 302. — Tortue écrite Latr. rept. I. 151. et II. 288.

Test. scabra L. Thunb. fide Schoepf. Veram scabram L. i. e. dorsatam Schoepf. mecum communicavit ill. Thunberg.

§. 16.

Spec. 3. *Emys dorsata* Schoepf.

Primam accuratiorem neque tamen omnibus numeris absolutam descriptionem de hac specie exhibuit perill. Lacépède sub nomine sequenti.

Test. scabra, (la tortue raboteuse) scutellis albescentibus, nigro-fasciatis, in medio dorsi valde elevatis, testa inferiore acute denticulata. Lacép. quadr. ovip. I. p. 161. tab. 10. — Bechst. Ueberf. I. p. 239. — Bonat. Erpet. p. 24. tab. 6. fig. 2. (ex Lacép.) Male tanquam terrestris descripta. — Latr. rept. I. 148. II. 288. — Daud. rept. II. p. 129. (Surinamia patria.)

Vidi specimen, quo usus perill. Lacépède, et nescio quo errore scutella testae laevia in descriptione dixerit.

Meliorē descriptionem exhibuit Schoepf.

Test. dorsata, testa ovali, demisse convexa, excelsè carinata scabra. Schoepf. hist. test. p. 136. tab. inedit.

Test. dorsata, pedibus digitatis, dorso medio cultrato, scutellis lateralibus medio carinatis, capitis lincis quatuor albicantibus caniventibus, testa rufa. Herrm. in litt. teste Schoepf.

Omnino eadem est, idque etiam in manuscriptis Schoepfii ex figura video a Wallbaumio missa:

Test. verrucosa. Wallb. chelonogr. p. 61. et 116. — Bechst. Naturg. Lacep. I. p. 304. — Daud. rept. II. p. 134. Male plantas unguibus quinque armatas dixit. — Latr. rept. I. 156. II. 289. — Test. scabra Gmel. syst. nat. 1040. quo duce Donnd. zool. Beytr. III. p. 17.

Test. scabra, pedibus palmatis, testa planiuscula, scutellis omnibus intermediis dorsatis L. syst. nat. XII. p. 351. (Patria Carolina.) — Rough tortoise. Shaw gen. Zool. III. p. 55. tab. 6, fig. 3. ex Lacep. libro, sub falso nomine: la bourbeuse. — Test. orbicularis. γ. Gmel. syst. nat. p. 1039. — Test. europaeae var.? Schneid. Schildkr. p. 326.; quem secutus Donnd. zool. Beytr. III. p. 14.

Testudo pedibus palmatis, testa orbiculata planiuscula, scutellis dorsalibus carinatis. Gronov. Zoophyl. n. 74. a Linn. ad test. scabram citata. — (Test. europaeae var. Menschen mus. Gronov.)

?Testudo terrestris amboinensis minor Seb. thes. I. p. 126. tab. 79. fig. 1 et 2. a Linn. in syst. nat. edit. XII. et a Gronov. ad test. scabram relata. — Test. amboinensis, unguibus acuminatis, palmarum, quinque plantarum quaternis Linn. mus. Adolph. Frid. p. 50. (Patria India orientalis.)

Quodsi figura, quam proposuit Seba, accurata sit,

haecce testudo a dorsata notis sequentibus differt: testa tricarinata, rufa, albido adspersa, margine sinuato-dentato et digitis palmarum plantarumque quinque unguiculatis.

§. 17.

Spec. 10. *Emys reticulata* Bosc.

Test. reticulata. Bosc. nouv. dict. d'hist. nat. Vol. 22. p. 263.

Test. reticulata, lorica dorsali striato-reticulata, fusco-atra, lineis rectis tennibus flavescensque in medio scutellorum, margine non denticulato, ad junctionem sterni trimaculato. Daud. rept. II. 144. ex manufr. Bosc.

Test. reticulata (la tortue réticulaire) Latr. rept. I. 124. II. 284. ex litt. Bosc.

§. 18.

Spec. 11. *Emys centrata* Bosc.

Test. centrata. Bosc. nouv. dict. d'hist. nat. Vol. 22. p. 264.

Test. concentrica (Concentric tortoise) testa ovata subdepressa subcarinata flava, scutellis zonis fuscis concentricis Shaw gen. Zool. III. p. 43. tab. 9. fig. testae, quae bona.

Test. centrata, lineis duabus aut quatuor atris, circulariter centratis in scutellis loricae superioris et marginis, sterno flavo immaculata, postice emarginato. Daud. rept. II. 153. ex manufr. Boscii.

Test. centrata (tortue à lignes concentriques) Latr. rept. I. 145. II. 287.

Test. Terrapin, testa supera depressa, scutellis

dorsi anterioribus carinatis, margine laterali costato, postico crenato. Schoepf. test. p. 64. tab. 15. fig. mala testae junioris. Descriptionem repetiit Bechst. Naturg. Lacep. I. 166.

The Terrapin, testudo quarta minima lacustris, unguibus palmarum quinque, plantarum quaternis, testa depressa ovali. Brown hist. nat. of Jam. p. 466. n. 4. (Habit. in Antillis et in Jamaica.) — Test. palustris Gmel. syst. nat. 1041. et Donnd. zool. Beytr. III. p. 2. — Latr. rept. I. 131. II. 285. — La Terrapène Lacep. quadr. ovip. p. 229. excl. syn. (test. Hecate Damp. quae E. ferrata.) Bechst. Ueberf. I. 165. — Bonat. Erpetol.

Test. Terrapin, edulis, praedecenti (i. e. testudine Hecate f. ferrata) minor, testa nebulosa variegata. Damp. voyage autour du monde I. p. 133.

§. 19.

Spec. 12. *Emys ferrata* Daud.

a. testa convexa oblonga, nigricante, luteo marmorata, scutello dorsali primo panduraeformi, marginalibus posticis sinuato-dentatis.

Test. rugosa (Wrinkled tortoise) rugosa nigra, flavo venuloso variegata, scutellis mediis panduraeformibus. Shaw gen. Zool. III. p. 28. tab. 4.

β. testa convexa ovali, nigro-fusca, fasciis irregularibus luteis, scutello primo subquadrato, marginalibus posticis sinuato-dentatis.

Test. ferrata. Bosc. nouv. dict. d'hist. nat. Vol. 22. pag. 264.

Test. ferrata, supra fusco et flavo transversim fasciata, scutellis marginalibus posticis bidentatis, mar-

gine laterali ad junctionem cum sterno quinque maculato Daud. rept. II. p. 148. c. fig. pessima.

Emydem ferratam *E. reticulatae* affinem dixit cel. Daudin plane singulari errore, nam toto coelo differunt, idquod in museo Boscii ex ipsis speciminibus vidi, quibus usus est clar. vir.

γ. testa pallide flava, disco utroque latere sulco profundo circumscripto.

Vidi huiusmodi varietatem in museo parisiensi.

δ. testa globosa albida, scutellis rugoso - scabris, marginalibus posticis acute ac profunde dentatis.

Testa speciminis adulti mus. par. de qua locutus est Daud. rept. II. 152.

Obs. Testa huius speciei mirum in modum variat: in proveciori aetate multo convexior est, postice magis dilatata dentibus profundioribus et acutioribus: in juniore aetate color testae obscurior, margo posticus sinuato-dentatus et superficies minus scabra.

Ab hac specie vix differunt:

Species nova testudinum duaeque varietates Herrm. observ. zoolog. ed. Hammer p. 224 sq.

Tortue Hecate. Dampier voyage autour du monde. I. 133. — Alia test. Hecate Brown, (geometrica?)

§. 20.

Spec. 16. *Emys planiceps* Schneid.

Test. planiceps, testa elliptica, scutellis disci mediis concavis, lateralibus infractis, margine reflexo. Schoepf. hist. test. p. 115. tab. 27.

Test. planiceps seu platycephala. Schneid. Schrift. der Berl. Ges. naturf. Fr. IV. Bd. 3s St. p. 259.

ca. fig. — Bechst. Ueberf. der Naturg. Lacep. I. p. 314 —
Donnd. zool. Beytr. III. p. 34.

Test. *Martinella*, testa ovali planiuscula, scutellis vertebralibus concavis, lateralibus subcarinatis, sterno scutellis tredecim. Dand. rept. VIII. p. 344. — Vidi specimen auctoris in musco parisiensi.

§. 21.

Spec. 18. *Emys lutaria* Linn.

Test. *lutaria*, lorica atra unicolore, digito exteriore palmarum mutico Dand. rept. II. 115. excl. syn. amoen. acad. (T. tabulata)

Test. *lutaria* (la tortue bourbense) testa superiore nigra, scutellis striatis, in medio punctatis. Lacep. quadr. ovip. I. p. 118. tab. 4. — Bechst. Ueberf. I. 144. excl. syn. amoen. acad. (T. tabula.) — Mud. tortoise Shaw. gen. Zool. III. p. 32. — Latr. rept. I. 112. II. 283. — Bonat. Erpet. p. 26.

Test. *lutaria*, pedibus subpalmatis, cauda corpore dimidio brevior, testa planiuscula, postica scutellis tribus carinatis. L. syst. nat. XII. 352. excl. syn. amoen. acad.* — Schneid. Schildkr. p. 338. — Gmel. syst. nat. 1040. excl. syn. amoen. acad. et var. β . (T. tabulata) nec non var. γ . (T. marginata.) — Donnd. zool. Beytr. III. p. 18. excl. var. β . (test. tabulata) et var. γ . (test. marginata.)

*) Testudo unguibus acuminatis, palmarum plantarumque quaternis. Areolae striis angulatis cinctae, punctatae. Pedes latiusculi nec in digitos dilatati. Rectius itaque haecce descriptio a Wallbaumio ad testudinem tabulatam refertur, excludenda autem syn. mus. grew. (E. Schnelderi.) mus. Worm. (Spec. dubia.) et Raf. syn. quadr. p. 269. (Spec. mus. Worm.)

(Testuggine di fiume. Cetti Storia di Sardegna III. 92.)

Test. terrestris ceylonica minor, Jurukua dicta. Seb. thes. I. p. 129. tab. 80. fig. 4. — Jurukua Klein dispos. quadr. p. 98.

Discernenda ab hac test. Jurukua Marcgr., quae Ch. Mydas.

Test. aquarum dulcium seu lutaria, Raj. quadr. p. 254.

Test. lutaria. Rondel. pisc. II. 170. Maxime affinis:

Testudo. Ruysch. Jonstoni theatr. anim. tab. 80. — Kolben descript. promont. b. sp. tab. 6. fig. Jonston. excl. descr. p. 164., quae de test. graeca aliisque confuse agit.

§. 22.

Spec. 19. *Emys punctularia* Daud.

? Test. Alacacca. Stedmann voyage à Surinam. Trad. franç. II. p. 357.

Racaca Cayennae appellatur. Richard.

§. 23.

Spec. 20. *Emys europaea* Schneid.

Test. flava (la tortue jaune) lorica dorsali atra five badia, punctis lineisque flavis radiatim dispositis. Daud. rept. II. 107. excl. syn. Lacep. et Latr. (T. rotunda.)

Test. europaea, testa ovali planiuscula, subcarinata, fusco-atra, punctis striisque albo-flavescentibus, radiatis. Schœpf. hist. test. p. I. tab. I. excl. syn. Raj. (quadr. 254. E. lutaria.) Descriptionem repetiit Bechst. in Ueberf. v. Lacep. Naturg. I. 157. — Speckled tortoise Shaw gen. Zool. III. p. 30. tab. 5. excl. syn. Raj. — Test. orbicularis Donnd. zool. Beytr. III. p. 11. excl. syn.

Lacep. tab. 5. et Schneid. zweit. Beytr. (T. rotunda.)
nec non var. β . (E. guttata) et var. γ . quae E. dorsata.

Test. flava, pedibus subdigitatis, testa orbiculari
planiuscula, scutellis laevibus, corpore toto viridi-flavo
maculato. Bonat. Erpet. p. 26. tab. 5. fig. 2.

Test. flava, testa superiori viridi, flavo maculata.
Lacep. quadr. ovip. I. p. 135. tab. 6. — Bechst. Ueberl.
I. p. 190. — Latr. rept. I. 103. II. 282.

Test. europaea, testa orbiculari planiuscula laevi.
Schneid. Schildkr. p. 323. — Test. orbicularis Gmel. syst.
nat. 1039. excl. var. β . (E. guttata) et γ . (E. dorsata).

(Test. Meleagris. Naturalist's Miscellany IV. 144)

Test. orbicularis, testa orbiculari planiuscula,
pedibus palmatis. Linn. syst. nat. XII.

Test. lutaria. Herrm. observ. zool. ed. Hammer.
p. 225. — Vidi specimen auctoris Argentorati in museo
cel. Hammer.

Test. punctata. Gottwaldt Schildkr. fig. 12.
Wasser-Schildkroete. Meyer. Zeitvertr. I. tab. 29.

Knorr. delic. natur. sel. II. p. 127. tab. 52. fig. 5.

(Testudo lutaria. Marigli Danub. illustr. IV.
tab. 33 et 34)

(Test. lutaria. Brunnich spol. mar. adriat. p. 90.)

§. 24

Spec. 21. Emys caspica Gmel.

Test. caspica, testa orbiculari, palmarum unguibus
quinis; plantarum quaternis, capite squamato, cauda
nuda. Gmel. it. russ. III. p. 59. tab. 10 et 11. — Caspian
tortoise Shaw gen. Zool. III. p. 63. — Test. Caspica
Dand. rept. II. 124 (lege cauda nuda pro nulla.) —
Bechst. Ueberl. der Naturg. Lacep. I. 283. — Donnd.

zool. Beytr. III. p. 21. — Gmel. syst. nat. 1041. — Schneid. Schildkr. p. 344.

Speciem praeter Gmelin nemo vidit.

§. 25.

S. 22. *Emys picta* Herrm.

Test. picta (painted tortoise) testa oblonga, demisse convexa laevi fusca, scutellis flavo marginatis. Shaw gen. Zool. p. 45. tab. 10. excl. syn. Brown. (*E. cinerea*).

Test. picta; lorica dorsali oblonga, convexa, laevissima, scutis subquadrangularibus flavo marginatis, sterno longitudine scuti. Daud. rept. II. 164. excl. syn. Brown.

Test. picta, testa oblonga, demisse convexa, laevissima, scutellis disci medii subquadrangularibus, flavo marginatis sterno longitudine scuti. Schoepf. hist. test. p. 20. tab. 4 — Bechst. Ueberf. der Naturg. Laccp. I. 285. — Tortue peinte Latr. rept. I. 141. — Donnd. zool. Beytr. III. p. 30.

Test. picta, testa plana, utrinque macula duplici ex atro-caerulescente notata, scutellis margine flavo cinctis, collo per longitudinem flavo nigroque striata. Gmel. syst. nat. 1045. ex Schneid. Schildkr. p. 348. Test. picta ex litt. Herrmanni.

Test. novae Hispaniae, Lusitanis Kagado d'Agos. Seb. thes. I. 129. tab. 80. fig. 5.

Flat brook turtle in Pennsylvania appellatur. Schoepf.

§. 26.

Spec. 23. *Emys cinerea* Brown.

The cinereous tortoise. Brown, non illustr.

of zool. 1776. p. 115. tab. 48. fig. 1. 2. — Schneid. Samml. verm. zool. Abhandl. p. 306. — Test. cinerea Bonat. Erpet. p. 25. n. 14. — Schoepf. test. p. 18. tab. 3. fig. 2. 3. (fig. Brown.) — Dound. zool. Beytr. III. p. 32. — La tortue cendrée. Latr. rept. I. 134. Ab alijs v. c. Shaw, Daudin E. pictae adscripta.

Test. cinerea, Browns aschfarbige Fluss-Schildkroete. Schneid. Schrift. der Berlin. Gesells. naturf. Fr. IV Bd. 3s St. p. 268. — Descriptionem repetiit, adjecta fig. Brown., Bechst. Uebers. der Naturg. Lacep. I. 308.

Specimen, quo usus est Schneider, in museo Blochiano servabatur.

§. 27.

Spec. 25. *Emys galeata* Schoepf.

Test. scabra Retz (galeata Schoepf. (testa depressa ovali, -dorsi scutellis tribus intermediis acute carinatis, marginis viginti quatuor. Schoepf. hist. test. p. 12. tab. 3. fig. 1. excl. syn. L. (E. dorsata.) — Galeated tortoise Shaw gen. Zool. p. 57. tab. 12. — Bechst. Uebers. der Naturg. Lacep. I. 293. — Daud. rept. II. 136. — Tortue à casque Latr. rept. I. 152. II. 288.

§. 28.

Spec. 26. *Emys subrufa* Lacep.

Test. subrufa, castanea, scutellis disci complanatis, in medio laevibus, margine substriatis, sterno tredecim scutellis, digitis omnibus quinque unguibus. Daud. rept. II. 132.

Test. subrufa, digitis fissis, testa orbiculari depressa subrufa, scutellis tenuibus substriatis. Bonat. Erpet. p. 28. tab. 6. fig. 5.

Test.

Test. subrufa, (la tortue roussâtre,) colore sub-
ruffo, testa superiore depresso, scutellis tenuibus. Lacep.
quadr. ovip. I. p. 173. tab. 12. — Test. badia. Bechst.
Ueberf. der Naturg. Lacep. I. 259. — Donnd. zool.
Beytr. III. p. 34. — Latr. rept. I. 120. II. 284.

§. 29.

Spec. 27. Test. planitia Gmel.

Testudo pedibus eursoriis, unguibus acuminatis
quinis, palmarum plantarumque, testa ovali convexa laevi.
Gronov. Zooph. n. 76. mus. ichthyol. II. p. 86. n. 70. —
Test. planitia Gmel. syst. nat. 1045.

Species e descriptione Gronov. tantum nota est, mi-
nime accurata: E. expansae affinis videtur, nisi eadem.

§. 30.

Spec. 28. Emys longicollis Shaw.

Test. longicollis (long necked tortoise) testa
ovata glabra, collo longissimo. Shaw gen. Zool. III. p.
62. tab. 16. et Zool. N. Holl. I. p. 19. tab. 7. — (Goett.
Journ. der Naturw. v. Gmelin. 1r Bd. 2s Hest p. 146.) —
Schoepf. test. hist. p. 133. tab. inedit. — Bechst. Ueberf.
der Naturg. Lacep. I. 321.

Tortue à long cou, ad nat. picta a Wailly, quae
figura elegantissima servatur in collectione bibliothecae
mus. par. inscripta Velius du museum d'histoire naturelle.

§. 31.

Spec. 29. Emys guttata Schneid.

Test. punctata. Bosc. nouv. dict. d'hist. natur.
Vol. 22. p. 265.

Test. guttata, (spotted tortoise) Shaw gen. Zool.
III. p. 47. tab. 10.

Archiv für Naturwissensch. IV. St.

E c

Test. punctata, ovata, modice convexa, lorica dorsali capitequo laevibus, nigris, flavo punctatis. Daud. rept. II. 159.

Test. punctata, testa oblonga, modice convexa laevi, fusca, guttis flavis sparsis. Schoepf. hist. test. p. 25. tab. 5. — Bechst. Ueberf. der Naturg. Lacep. I. 310. — Latr. rept. I. 110. — Donnd. zool. Beytr. III. p. 33.

Test. guttata (Getüpfelte Flufs-Schildkröte). Schneid. Schrift. der Berl. Gesells. naturf. Fr. IV Bd. 3s St. p. 264.

Testudo e mus. Bloch. Schneid. Schildkr. 2r Beytr. p. 30.

Testudo. Gottwaldt. Schildkr. fig. 15.

?Testudo quarta. Herrn. observ. zool. ed. Hammer. p. 225.

§. 32.

Spec. 31. Test. Spengleri Wallb.

Test. ferrata. (ferrated tortoise) testa depressa flavicante, punctis subfuscis irrorata, scutellis omnibus disci carinatis, margine postico testae ferrato. Shaw gen. Zool. III. p. 51. tab. 9.

Test. Spengleri. Wallbaum Schrift. der Berl. Gesells. naturf. Fr. VI. p. 122 fq. tab. 3. — Test. areolatae var.? Shaw gen. Zool. III. p. 50. — Test. Spengleri. Bechst. Ueberf. der Naturg. Lacep. I. 332. — Daud. rept. II. 103. — Test. serpentinae var. Latr. rept. I. 163. — Test. Spengleri. Donnd. zool. Beytr. III. p. 24. — Gmel. syst. nat. 1043. — Schneid. Schildkr. I. Beytr. p. 8.

§. 33.

Spec. 34. Emys Retzii Schoepf.

Test. Retzii, testa orbiculari, lorica dorsali tri-

carinata, scutis vertebralibus transversis. Daud. rept. II. 174. ex Schoepf.

Test. tricarinata Retzii, testa ovali demisse convexa, margine integra, scutellis disci omnibus carinatis. Schoepf. hist. test. p. 9. tab. 2. fig. pulli. — Test. tricarinata Bechst. Ueberf. der Naturg. Liacep. I. p. 297. — Tricarinated tortoise. Shaw gen. Zool. III. p. 54. tab. 11. fig. Schoepf. — Tortue à trois carènes. Latr. rept. I. 118. II. 283.

9. 34

Spec. 35. *Emys scorpioides* Lacep.

Test. tricarinata, testa ovali, lorica dorsali longitudinaliter tricarinata, scutis vertebralibus oblongis posticeque imbricatis. Daud. rept. II. 178.

Test. scorpioides, testa superiore tribus lineis longitudinalibus elevata, quinque scutellis medii dorsi elongatis, testa inferiore ovata, cauda unguiculata. Latr. quadr. ovip. I. p. 133. excl. syn. Schneid. (Ch. fimbriata). — Bechst. Ueberf. I. 187. — Bonat. Erpet. p. 27.

Vidi specimina cel. Lacépède et Dandin. — Eadem species videtur:

Test. scorpioides, palmarum unguibus quinis, plantarum quaternis, fronte callosa triloba, cauda unguiculata. L. syst. nat. ed. XII. p. 352. edit. Gmel. p. 1041. Latr. rept. I. 99. — Donnd. zool. Beytr. III. p. 19.

β. var. scutello vertebrali antico longissimo, marginalibus anticis nullis.

Test. pennsylvanicae var.? Shaw gen. Zool. III. p. 61. tab. 15.

§. 35.

Spec. 36. *Emys pensylvanica* Edw.

a. scutellis dorfi laevibus.

Test. *pensylvanica*. Bosc. nonv. dict. d'hist. nat. Vol. 22. p. 266. et in Latr. hist. nat. rept. I. 133. excl. syn. Bonat. la tortue prisonnière, quae *E. virgulata*.

Test. *pensylvanica*, lorica superiori laevi subrubra unicolore, in medio planiuscula, scutis vertebralis, secundo, tertio et quarto, hexagonis obliquis postice subimbricatis, primo et quinto elongatis subtrigonis, scutis marginalibus viginti tribus, cauda apice unguiculata. Daud. rept. II. p. 182.

Test. *pensylvanica*, testa elliptica laevi unicolore, dorso planiusculo, scutellis intermediis subimbricatis, prima subtriangulo, marginis viginti tribus. Schoepf. hist. test. p. 107. tab. 24. fig. A. — *Pensylvanian tortoise* Shaw gen. Zool. III. p. 60. tab. 17. fig. Edw. excl. syn. (*E. scorpioides*). — Bechst. Ueberf. Nat. Lincep. I. p. 180. — Donnd. zool. Beytr. III. p. 22.

Test. *pensylvanica*, palmarum unguibus quinque plantarum quaternis, caudae apice corneo acuto. Gmel. syst. nat. ex Seligm. av.

Test. *lutaria pensylvanica* (small mud-tortoise) Edw. gleanings of nat. hist. tab. 287. — *Kleine Morast-Schildkroete*. Seligm. Voeg. VIII. tab. 77. — *Schneid. Schildkr.* p. 347. — Test. subrubra (la tortue rougeâtre. (Lacep. quadr. ovip. I. p. 132. Bechst. Ueberf. I. p. 178. — Bonat. Erpet. p. 27. n. 19. tab. 5. fig. 1. ex Edw. libro.

(Gentlemans Magazin. January 1758.)

Test. *Jaboti secunda*. Piso hist. nat. Ind. oc-

cid. III. p. 105. fig. 2. Habitat in Brasilia. Figura
E. pensylvanicae simillima est.

? Test. Jururá Lusitanis Kagado d'Agoa. Piso ibid.
 ex Marcgr. hist. Bras. Libr. VI. Cap. 15.

Descriptio minime accurata est, attamen ab *emyde*
pensylvanica parum aliena, sed differt partium mensura.
 Eundem locum Klein et Seba ad testudinem areolatam
 referunt et nomine Kagado d'Agoa Seba *emydem pictam*
 appellat. Inextricabilis fere est nominum specierumque
 confusio.

§. scutellis dorsi leviter carinatis.

Huiusmodi specimina vidi in museo cel. Bosc, et
 descriptionem huius varietatis dedit Shaw gen. Zool. III.
 p. 61.

γ. sterno immobili.

Test. *pensylvanicae* var. Schoepf. test. hist.
 p. 110. tab. 24. fig. B. — Bechst. Uebers. der Naturg.
 Lacep. I. 185.

Vidi in museo societatis naturae scrutatorum Bero-
 linensium testam, qua usus Schoepf: *E. pensylvanicae*
 adeo simillima est ut, usque dum integrum animal in-
 notuerit, disjungi plane non possit. Male itaque Daudin,
 hist. rept. II. 194, varietatem tanquam speciem propriam
 sub nomine test. glutinatae (tortue à battans soudés)
 descripsit.

§. 36.

Spec. 37. *Emys odorata* Bosc.

Test. odorata. Bosc. nouv. dict. d'hist. nat. Vol.
 22. p. 267.

Test. odorata, lorica superiore laevi fusciscente
 unicolore, in medio planiuscula, sterno antico solum

mobili, scutis marginalibus viginti tribus, cauda apice unguiculata. Daud. rept. II. 189. ex manuscr. Bosc. Characteres a cel. Daud. propositi de pullis tantum valent.

Test. odorata (la tortue odorante) Latr. rept. I. 122. II. 284. ex manuscr. Bosc.

§. 37.

Spec. 39. *Emys amboinensis* Riche.

Test. amboinensis, testa convexa laevi fusca, sterno bivalvi, margine flavo maculato, capite compresso fusco, genis rostroque flavo lineatis, pedibus palmatis. Daud. rept. II. p. 309.

Test. amboinensis. Marchand voyage autour du monde. II. p. 506.

§. 38.

Spec. 40. *Emys subnigra* Lacep.

Test. subnigra, lorica dorsali rotundata convexa, scutis margine striatis, medio nitentibus, squamis vertebralibus carinatis, lorica inferiore bracteis tredecim squamata. Daud. rept. II. p. 197. ex Lacep. et e manuscr. Van-Ernest. ex cl. var. β . quae E. castanea.

Test. subnigra (la tortue noirâtre) colore subnigro, scutellis crassis valdeque laevibus, Lacep. quadr. ovip. I. p. 213. tab. 7. fig. 2. Bechst. Ueberf. I. p. 260. — Latr. rept. I. 89. II. 280.

§. 39.

Spec. 42. *Emys clausa* Bloch.

a. testa globosa, scutellis marginalibus verticalibus.

a) Specimen Edw.

Test. clausa (close tortoise) testa nigricante, maculis difformibus subconfertis flavis, -carina dorsali ob-

tufa, ſterno bivalvi loricam occludente Shaw gen. Zool. III. p. 36. tab. 7. fig. Edw.

Test. brevitaudata (la courte queue) teſta ſuperiore antice emarginata, ſcutellis ſtriatis in medioque punctatis. Lacep. quadr. ovip. I. p. 169. Bechſt. Ueberſ. I. 254 excl. ſyn. Seb. (teſt. graeca.) — Teſt. carolina (la tortue courte queue. Bonat. Erpet. p. 28. n. 23. — Latr. rept. I. 127.

Teſt. carolina, pedibus digitatis, teſta gibba, canda nulla. L. ſyſt. nat. XII. p. 352. ex Edw. — Edit. Gmel. 1041. excl. ſyn. Seb. (teſt. graeca, jam in amoen. acad. ad Ch. Mydas a Linneo male citata.) — Schneid. Schildkr. p. 334 — Donnd. zool. Beytr. p. 20.

Teſt. terreſtris carolinenſis. Edw. av. tab. 205. — Seligm. VI. tab. 100. — Bechſt. Ueberſ. der Nat. Lacep. I. 329. c. fig. Edw.

Figura, quam curavit Edward, a ſpeciminibus paululum recedit, quae in muſeis vidi, ſcutellis nimirum lateralibus quadratis nec obliquis, areolis oblitteratis et prope centrum ſcutellorum, poſitis. Sed haec diverſitas ex errore ſculptoris orta videtur.

Testudo pedibus digitatis calloſo-ſquamolis, teſta ovali ſubconvexa, ſcutellis planis ſtriatis medio punctatis. Gronov. Zoophyl. p. 17. n. 77.

Locus obſcurus, a Linn. ad teſt. carolinam citatus, et vix eo pertineat.

b) Specimen Schoepfii.

Teſt. clauſa Bloch., teſta ovali gibba, dorſi ſcutellis carinatis, ſterno bivalvi, loricam occludente. Schoepf. teſt. p. 32. tab. 7. excl. ſyn. muſ. grew. (E. Schneideri) et Bonat. (E. virgulata.) — Bechſt. Ueberſ.

der Naturg. Lacep. I. p. 323. — La tortue courte quené.
Daud. rept. II. p. 207. adjecta descriptione speciminis e
mus. Bosc. de quo infra sub β dicesur, excl. syn. mus.
grew. — Test. clausa. Dound. zool. Beytr. III. p. 21.

c) Specimen Blochianum.

Dosenschildkroete. Bloch Schrift. der Berl.
Gesells. naturf. Fr. VIIr Bd. 1s St. p. 131. tab. i. fig. i
et 2. — ibid. VIIIr Bd. 1s St. p. 14. — Test. clausa Gmel.
syst. nat. 1042. — Latr. rept. I. 139.

Scutella marginalia rhomboidea, areolae oblitteratae
excentricae. Eadem est testae conformatio, quae in museo
parisiensi servatur.

β . testa convexa, scutellis vertebralibus planis,
marginalibus horizontalibus. — Varietas media
inter veram E. clausam et virgulatam.

Test. clausa. Bosc. nouv. dict. d'hist. nat. Vol.
22. p. 265.

Test. clausa (tortue à boîte) Daud. rept. II. p.
208. e manuscr. Bosc.

Test. incarcerato-striata (la prisonnière striée)
digitis fissis, testa elliptica convexa, scutellis striatis fuscis,
luteo-maculatis. Bonat. Erpet. p. 29. n. 25.

Test. clausa, elusilis, scuto valde convexo, inter-
rupte carinato, sterno planiusculo. Wallb. Schrift. der
Berl. Gesells. naturf. Fr. VIIr Bd. 4s St. p. 292.

* * *

Wood-turtle in Pennsylvania appellatur. (Schoepf.)
Terrapin in Carolina. (Edwards).

Spec. 43. *Emys virgulata* Daud.

Test. virgulata. Bosc. nouv. dict. d'hist. nat.

Vol. 22. p. 266.

Test. virgulata (tortue à goutelettes) fusco-atra, guttis luteis numerosis maculata, scutis vertebralibus in medio longitudinaliter subcarinatis. Daud. rept. II. 201.

Test. virgulata (tortue à petites raies) corpore et testa luteo maculatis, scutellis fuscis glaberrimis, tredecim difci, vertebralibus hexagonis, lateralibus quadratis, scutellis marginalibus 24—25, sterno luteo, mobili, cauda brevissima. Latr. rept. I. 100. II. 282. e manuscr. Bosc.

Test. incarcerata, (la prisonnière), digitis fissis, testa elliptica admodum convexa, scutellis laevibus fuscis, fasciis luteis rivulatis. Bonat. Erpet. p. 29. n. 24.

Test. carinata (la bombée) testa superiore valde carinata, scutellis subviridibus flavoque lineatis, testa inferiore ovata. Lacep. quadr. ovip. I. p. 164. Bechst. Ueberf. I. 248.

Vidi specimen ill. auctoris in museo cel. Lamarck.

? Test. carinata, pedibus digitatis, testa gibbosa, scutellis dorsalibus quatuor, anterioribus carinatis, sterno integro. L. syst. nat. XII. p. 353. edit. Gmel. p. 1043. — Schneid. Schildkr. p. 361. — Donnd. zool. Beytr. III. p. 27.

Obs. Formam testae variare jam supra monuimus. In specimine ill. Lacépède testa fere globosa, scutella femoralia horizontaliter declivia et scutella vertebralia leviter complanata sunt: in speciminibus e Carolina a cel. Bosc. allatis scutella dorsalia plana sunt, et margo testae

valde revolutus, quae ipsa minori tantum convexitate gaudet: denique in specimine, quo usus Dandin scutella vertebralia plana sunt, marginale anticum angustissimum longum et margo testae posticus revolutus.

§. 41.

Spec. 44. *Emys Schneideri* mihi.

? Test. carinata. Shaw gen. Zool. III. p. 35. descr. spec. e mus. Leveriano.

? Test. virginica, mus. grew. p. 38. tab. 3. fig. 2. a Linn. ad test. pusillam citata et a Schoepf. ad *E. clausam* translata. Descriptio, quam de test. carinata exhibit Linne, etiam in has species quadrat, ita ut nil certi contendere liceat.

§. 42.

Emys polyphemus Bartr.

Test. polyphemus (la tortue Gopher) naso tenni acuto, squamis tennibus, colore cinereo-griseo, unguibus palmarum planis et suborbiculatis Daud. rept. II. 256 ex Bartr.

Test. polyphemus. Bartr. travels through north and south Carolina. Ed. II. London 1794. p. 18. — Magaz. der Reisebeschr. Xr Bd. p. 175. — Bechst. Ueberf. der Naturg. Lacep. I. 367.

§. 43.

Spec. 2. *Testudo signata* Wallb.

Test. signata, testa ovali convexa, gilvo-grisea, nigro punctata, marginis scutellis viginti sex, acute dentatis. Schoepf. hist. test. p. 120. tab. 28. fig. 2. 3. fig. Wallb.

Test. signata Wallb. chelonogr. p. 120. c. fig. — Bechst. Ueberf. der Naturg. Lacop. I. 243. — Male test

denticulatas var. Gmel. syst. nat. 1043. — Donnd. zool. Beytr. III. p. 25.

§. 44.

Spec. 4. Testudo areolata Thunb.

Test. areolata (areolated tortoise) Shaw gen. Zool. p. 56.

Test. areolata. Bechst. Ueberf. der Naturg. Lacép. I. 355 sq.

Test. areolata (la tortue areolée) ovato-oblonga, modice convexa, scutellis subquadratis elevatis, profunde fulcatis, areolis depressis scabris. Daud. rept. II. 287.

Test. areolata, oblonga, modice gibba, scutellis subquadrangulis elevatis, profunde fulcatis, areolis depressis scabris. Schoepf. hist. test. p. 104 tab. 23. — Donnd. zool. Beytr. III. p. 33. — La tortue carrelée Latr. rept. I. p. 157.

Test. areolata, pedibus digitatis, testae gibbosae scutellis elevatis subquadrangulis, striatis, medio depressis scabris. Thunb. nov. act. acad. suec. Vol. VIII. p. 180. — Schneid. Schrift. der Berl. Gesells. naturf. Fr. Xr Bd. 3s St. 1791. p. 267.

Test. terrestris brasiliensis. Seb. thes. I. tab. 80. fig. 6. — Klein dispos. anim. p. 89. excl. syn. Marcgr. (test. Jurnra quae aquatilis et forsitan E. pensilvanica. — Schneid. Leipz. Magaz. 1786. p. 277.

Testudo. Gottwald Schildkr. fig. 14 a. Wallbaumio ad test. tabulatam male citata.

? Knorr delic. nat. select. II. 127. tab. 52. fig. 1.

§. 45.

Spec. 7. Testudo angulata Dumer.

Figura 2 in Knorr. delic. natur. select. II. p. 127.

tab. 52. huc forsitan pertinet, at rudis est, quare nil de ea affirmarem, eoque minus quum testudo angulata tabulatae valde affinis sit.

§. 46.

Spec. 8. Test. tabulata Wallb.

Test. tabulata (tabular tortoise) testa oblonga gibba fusca; scutellis disci rectangulis fulcatis, areolis flavescens. Shaw gen. Zool. III. p. 41. tab. 8.

Test. tabulata. Bechst. Ueberl. der Naturg. Laccp. I. p. 347. c. descr. speciminis e museo Meiningsi.

Test. tabulata, testa oblonga gibba, scutelli disci rectangulis fulcatis nigris; areolis luteis subgibbosis, scutellis marginalibus viginti tribus nigris, inferne luteis. Daud. rept. II. 242.

Test. tabulata, testa oblonga gibba, scutellis disci rectangulis fulcatis, areolis subgibbis, margine aequali, scutellis viginti tribus. Schoepf. hist. test. p. 56. tab. 12. fig. 2 et tab. 13. — Donnd. zool. Beytr. III. p. 31. — La tortue à marqueterie Latr. rept. I. 85. II. 280.

Test. tabulata Wallb. chelonogr. p. 70 et 122. excl. syn. L. (E. lutaria.)

Test. graeca; pedibus subdigitatis, testa postice gibba, lateribus obtusa, subcarinata, scutellis planiusculis, medio-depressis, tuberculatis, scutello marginali anteriori nullo. Herrm. observ. Zool. ed. Hammer. p. 219.

Test. tessellata Schneid. Schrift. der Berl. Gesell. naturf. Fr. IVr Bd. 3s St. p. 262.

Test. terrestris squamis aureis tessellata Plumieri Gautier observ. sur l'hist. natur. I. pars 3. p. 150. tab. G.

Test. terrestris brasiliensis Seb. I. p. 129. tab. 80. fig. 2. excl. test. Kagado de terra Marcgr. quae test. geometrica. — Test. Jaboti Klein dispos. anim. p. 97. excl. eod. syn. Marcgr.

Test. terrestris americana. Kil. Stobaens in act. litt. et scient. suec. 1730. p. 59. excl. syn. Marcgr. (test. geometrica.) — Schneid. Schildkr. p. 362. — Gmel. syst. nat. p. 1045. n. 38.

Eadem species videtur:

Testudo unguibus acuminatis, palmarum plantarumque quaternis. L. amoen. acad. I. p. 139. excl. syn. mus. grew. quae forsitan E. Schneideri est, nec non mus. worm. et Raj. qui de specie quadam obscure agunt, cuius descriptio tamen a test. tabulata longe recedit.

In syst. nat. edit. XII. Linneus hunc locum ad test. pusillam retulit, de qua infra diximus, descriptio autem optime in test. tabulatam quadrat.

β. var. cayennensis.

(?test. terrestris Surinamensis. Stedm. voyage à Surinam. Trad. franç. II. p. 357.)

§. 47.

Spec. 9. Testudo marginata Schoepf.

Test. marginata (la tortue bordée) testa oblonga convexa gibbosa, scutellis dorsalibus fusco-nigris, in medio luteis, scutellis marginalibus 23 ant 24 oblique nigris et luteis. Daud. rept. II. p. 233.

Test. marginata, testa oblonga gibba, lateribus retusa, margine postico explanato-depressa, scutellis viginti tribus. Schoepf. hist. test. p. 52. tab. 11 et 12. fig. 1. — Bechst. Ueberf. der Naturg. Lacép. p. 215. —

Marginated tortoise Shaw gen. Zool. III. p. 17. c. fig. —
Donnd. zool. Beytr. III. p. 33. — Latr. rept. I. p. 79.

Test. graja, pedibus subdigitatis, testa postice
explanato-depressa, lateribus retusa, scutellis subgibbis
glabris, scutello marginali anteriori lineari. Herzm. ob-
serv. zool. ed. Hammer. p. 219.

Test. graeca Lacop. quadr. ovip. I. tab. 8. —
Major pars descriptionis, quam dedit ill. Lacépède, in
hanc speciem quadrat, confunduntur autem historiae te-
studinum marginatae, graecae, indicae aliarumque. —
Bechst. Ueberl. I. p. 200. — Test. graeca Bonat. Erpet.
p. 23.

Test. campanulata Wallb. chelonogr. p. 124.

Hunc locum de E. lutaria intellexerant cel. Gmelin
et Donndorff, descriptio autem multo magis cum test.
marginata convenit, eique omnino respondet.

Pfuhlschildkroete. Mayer Zeitvertreib II.
tab. 6a.

§. 48.

Spec. 10. Test. graeca Linn.

Test. graeca (the common land-tortoise) testa
hemisphaerica nigro flavoque varia scutellis disci sub-
convexis, margine laterali obtuso, postico gibbo. Shaw
gen. Zool. III. p. 9. tab. 1.

Test. graeca (la tortue grecque) hemisphaerica,
scutellis disci subconvexis, vertebralibus subgibbosis, scu-
tellis marginalibus viginti quinque, ad latera obtusis,
omnibus luteis et nigris Daud. rept. II. p. 218.

Test. graeca, testa hemisphaerica, scutellis disci
subconvexis flavis, nigro cinctis, margine laterali obtuso,

postice gibbo Schoepf. hist. test. p. 38. tab. 8. A enim var. B. et tab. 9. — Bechst. Ueberf. der Naturg. Lincep. I. 220. — Donnd. zool. Beytr. III. p. 27. — Latr. rept. I. p. 65.

Test. graeca. Lincep. quadr. ovip. I. p. 142. excl. icone (test. marginatae) et parte descriptionis, quae sub eodem nomine de test. marginata, indica, aliisque agit. — Schneid. Schildkr. 2r Beytr. p. 17.

Test. graeca, pedibus subdigitatis, testa postice gibba, margine laterali obtusissimo, scutellis planiusculis. L. syst. nat. XII. p. 352. ex Raj. syn. anim. — edit. Gmel. 1043. — Schneid. Schildkr. p. 358.

(Test. graeca Blumenbach. Abbild. natur-hist. Gegenst. 7s Heft tab. 66.)

Test. carolina Herrm. observ. Zool. ed. Hammer.

Testudo. Schneid. Schildkr. p. 348. — Test. Herrmanni Gmel. syst. nat. 1041. — Donnd. zool. Beytr. III. p. 19.

Hanc locum huc pertinere monet Schoepf. sed descriptio mala. Conf. quae superiori libello p. 42. diximus.

(Test. geometrica, testa gibba tessellata, postice acute emarginata, pedibus fissis, cauda brevissima. Brunnich Spol. mar. adriat. p. 92.)

(Testuggine di terra Cetti Ist. di Sardegna. III. p. 9.)

Test. graeca Knorr delic. natur. III. pag. 125. tab. 51.

Landchildkroete Mayer Zeitvertr. I. tab. 28.

Test. terrestris major, Mydas dicta. Seb.

thes. L. tab. 80. fig. 1. a Linneo in amoen. acad. ad Ch.
Mydas citata et in syst. nat. ad test. carolinam. Confr.
§. 11. et 39. — Test. Mydas Klein. dispof. anim. quadr.
p. 97.

Test. vulgaris Klein. ibid.

Test. terrestris vulgaris. Raj. syn. anim. quadr.
p. 253.

Test. terrestris (ein irdische Schildkrott) Gessn.
quadr. ovip. p. 150. Thierbuch p. 170. — Patria India
orient.

? Test. terrestris africana, albo cortice tecta,
nigris quibusdam signis vermiculata Gessn. quadr. ovip.
Lib. II. p. 89.

Descriptiones denique, quae exstant in antiquioribus
libris sub titulo test. terrestris, montanae, syl-
vestris, campestris, agrestis, nemoralis etc.
ut plurimum ad hanc vulgatissimam speciem accedunt.

* * *

β. testudo graeca junior.

Test. pusilla, pedibus subdigitatis, testa hemi-
sphaerica, scutellis convexis trapeziis, margine striatis,
disco punctatis. L. syst. nat. XII. p. 353. edit. Gmel.
1044. — Schneid. Schildkr. p. 356. — Donnd. zool.
Beytr. III. p. 29. — Habitat ad Cap. b. sp.

Test. terrestris africana. Edw. av. IV. tab.
204 a Linneo in syst. nat. ed. XII. ad test. pusillam
citata et in edit. X. ad test. graecam, cujus imago est.
— Figuram et descriptionem Edwardi repetiit Bechst.
Ueberf. der Naturg. Lacep. I. p. 252. et Shaw gen. Zool.
III. 53. — Test. tabulatae var. Wallb. chelonogr. p. 81.

Linne

Linne descriptionem Edw. secutus ipse tamen animal non vidit. Femora nuda dicit sine squamis et marginem disci fascia albida cinctum, quem characterem e mus. Worm. petiisse credo. Hinc testudo appellatur la bande blanche a Daubenton encycl. method. — Adduxit Linn. tanquam synonyma test. in mus. grew. depictam et aliam in mus. worm. descriptam et a Rajo in syn. anim. citatam. Ambae autem species et inter se et a test. Edw., quae vera pusilla Linn., longe differunt. Auctores tamen, his citatis in errorem ducti, descriptiones trium specierum in unam fuderunt, ita ut testudinis pusillae historia omnino fabulosa evaderet. Quod ut magis appareat, illustrandae sunt:

1) test. virginea, mus. grew. p. 38. tab. 3. fig. 3. quae primo statim intuitu a figura Edw. discernitur. Schoepf. illum librum ad E. clausam citavit, rectius forsitan ad E. Schneideri referatur, quod jam supra §. 41. paucis monuimus.

2) test. terrestris ex India orientali. mus. worm. p. 317.

Hancce testudinem, cuius tamen figura desideratur, longe differre a test. virginea mus. grew. et africana Edw. docet sequens descriptio. „Testa superior vix 4 digitos longa et 4 lata. Tessellae eleganter pictae sunt, nigro albo, purpureo, subviridi, luteo, in commissura scutellorum nigro coloratae. Inferior testa albicans. In summitate capitis eminentia quaedam miniata, luteo interstincta. Pedes squamulis obiti, anteriores et posteriores quatuor unguibus exstructi. Cauda tenuis, in apicem terminata, vix digiti dimidii longitudine.“ Indò

Archiv für Naturwissensch. IV. St.

F f

auctores maiorem partem descriptionis testudinis pusillae petierunt. Sic corrigendae: test. pusilla, digitis membrana tectis, testa parva rotundata variegata protuberantia in vertice miniata. Bonat. Erpet. p. 23.

Citavit auctor figuras mss. grew. et Edw. av.; praeterea attulit ex amoen. acad. test. tabulatae descriptionem, et notas mss. worm. ex his libris male supplevit.

Similiter egit Lacepède:

Test. miniata, scutellis nigro albo purpureo subviridi flavoque variegatis. Lacep. quadr. ovip. I. 166. Bechst. Ueberf. I. p. 250. excl. quoque descr. Kolben. qui de diversis testudinibus sub uno nomine confuse locutus est. — La tortue vermillon Latr. rept. I. p. 92. excl. syn. Kolb.

His ducibus usus est Daudin:

Test. pusilla, scutellis testae nigro, albo purpureo viridi lacteoque variis, sterno albescente, tuberculo cervicali miniaceo Daud. rept. II. p. 299. excl. syn. L. Gmel. Schneid. et Edw. qui de test. Edw. agunt, nec minus Daubent. de quo jam supra discernimus.

3) testudo terrestris pusilla ex India orientali Raj. syn. anim. quadr. p. 259. Mera animalis descriptio secundum mss. Worm.

Quare testudo pusilla est animal factitium; descriptio Linn. maiori ex parte ex Edw. avibus sumta ad test. graecam pertinet: contra test. pusilla Bonat. Lacep. Daud. etc. potissimum e characteribus nata est, qui in mss. Worm. leguntur, quam speciem facile test. castram aut juvencellam putarem, saltem ab illis non longe distat.

Parvam testudinem ad Cap. b. sp. habitare et com-
 edi referunt auctores, an nova species sit non contem-
 derim. Verisimile est Linneum aliquam illius habuisse
 notionem at figuram Edw. eum in errorem induxisse.
 Ill. Thunberg huiusmodi testudinis, ab ipso in Africa
 repertae figuram mecum communicavit, quam test. areo-
 latam censet et eandem equidem statuo. — Primam men-
 tionem test. parvae promont. b. sp. fecit Kolben in descr.
 promont. huius, vers. vernac. p. 164. excl. fig. quae E.
 lutariae mala imago ex Jonstoni theatr. anim. depromta
 est: delicatissimam dixit sed descriptionem non addidit.
 Contra la Caille (voyage au Cap de bonne esperance p.
 350.) test. minimam Kolben. brevissimis citat tanquam
 cibum ingratum. Marchand (voyage autour du monde
 III. p. 190.) sub nomine: petite tortue du cap
 de cibo dulcissimo loquitur, descriptionem negligens,
 idemque agit Le Vaillant (1. voyag. en Afrique. Vol. I.
 p. 60.) neque ampliorem descriptionem mecum commu-
 nicare potuit, quum testam in Europam non adtulisset
 eamque omnino neglexerit. Quos auctores diversas spe-
 cies vidisse verisimile est. — Hagstrom denique in nov.
 act. Stockh. 1784 I. Nr. 6. p. 46. (edit. germ.) de te-
 studine quadam copiose loquitur, quam per plures men-
 ses vivam observaverat, eandemque pusillam L. credit.
 Ipsum autem dubia, quibus haec species implicata est,
 minime novisse, ex eius litteris facillime liquet. Quas
 vero in museis vidi testudines sub nomine pusillae diver-
 sissimae ac notissimae fuerunt.

In fine paragraphi locum obscurum addo, qui ad
 test. graecam spectat, ni fallor:

F f 2

test. africana, Herzm. observ. Zool. ed. Hammer
p. 218. Speciem non vidi.

§. 49.

Testudo fulcata Mill.

Testudo fulcata Mill. on var. subj. tab. 26.

A. B. C.

Descriptionem auctor non dedit et praeter eum
nemo hanc testudinem vidit: sed tabulam consulnerunt
sequentes:

Sulcated tortoise; an test. Hecate Brown?
aut test. tabulata? Shaw gen. Zool. III. p. 39.

Test. fulcata, caudata, pedibus digitatis, testa
gibba, scutellis lineatis fulco circumscriptis, Gmel. syst.
nat. p. 1045. — Daud. rept. II. p. 313. — Test. ele-
gans? Schoepf. hist. test. p. 135. tab. inedit.

Testudo calcarata, testa ovata convexa, sterno
antice et postice bifido, anterieus ultra marginem testae
prominente furca, palmarum unguibus quinis plantarum
quaternis, femorum calcaribus binis, fronte unguata.
Schneid. verm. zool. Abhandl. p. 315. c. fig. Mill. —
Bechst. Ueberf. der Naturg. Lacep. I. p. 346. c. fig. ex
Schneid. libro. — Schneid. Schildkr. 2r Beytr. p. 25.
Test. fulcata Donnd. zool. Beytr. III. p. 30.

§. 50.

Spec. II. Test. denticulata Linn.

Test. denticulata, testa orbiculato-cordata,
margine erosa. Schoepf. hist. test. p. 119. tab. 28. fig. I.
speciminis, quod ex ipsa collectione de Geeriana ac-
ceperat, qua usus est Linne.

Test. denticulata, pedibus subdigitatis, testa

orbiculato - cordata, margine eroso. L. syst. nat. edit. XII. n. 9. ex specimine mus. de Geerian. — Gmel. syst. nat. 1043. excl. var. β . quae test. signata. — Schneid. Schildkr. p. 360. — La tortue dentelée Lacep. quadr. ovip. p. 163. Bechst. Ueberf. I. p. 241. — Bonat. Erpet. p. 24. — Latr. rept. I. 159. — Donnd. zool. Beytr. III. p. 25. excl. var. β . (test. signata.) — Daud. rept. II. p. 303.

§. 51.

Spec. 12. Test. rotunda Latr.

Test. orbicularis, digitis membrana tectis, testa orbiculari planiuscula, scutellis laevibus fusco punctatis Bonat. Erpet. p. 25. tab. 4. fig. 4. ex Lacep. excl. syn. Linn. (E. europaea.)

Test. orbicularis (la tortue ronde) testa superiore planiuscula et orbiculari Lacep. quadr. ovip. I. p. 126. tab. 5. excl. syn. L. Wulf et Schneid. qui de test. orbiculari L. i. e. E. europaea Schneid. agunt. Bechst. Ueberf. I. 154. — Test. europaeae var. male Shaw gen. Zool. III. p. 32. tab. 5. fig. Lacep. — Daud. rept. II. p. 111. — Donnd. zool. Beytr. III. p. 13. — Test. Terrapin. Schneid. Schildkr. 2r. Beytr. p. 14 et Schoepf. test. p. 6.

Vidi pullos primae aetatis, quos descripsit ill. Lacépède. An testudo Europam inhabitet dubito, saltem in Borussia venalis non est, quod false asseruit illustris comes.

Test. rotunda, testa orbiculari, scutellis disci tredecim glabris, maculis ochreis adspersis, marginalibus viginti tribus, rostro acuto, cauda brevi Latr. rept. I. 107. II. 282.

§. 52.

Testudo elegans Seb.

Testudo elegans (elegant tortoise) testa orbiculata convexa flava, disco maculis transversis ovatis fuscis. Shaw gen. Zool. III. p. 49. tab. 6, fig. et descr. Seb.

Test. terrestris ceylonica elegans minor Seb. p. 126. tab. 79. fig. 3.

§. 53.

Spec. 13. *Testudo stellata* mihi

Test. elegans, testa hemisphaerica, scutellis fuscatis convexis, quadrifariam virgatis, areolis planis punctatis, latioribus quam longis. Schoepf. hist. test. p. III. tab. 25. excl. syn. Seb. (test. elegans) et Commerf. (test. radiata). — Latr. rept. II. 279. — Daud. rept. II. p. 266. excl. syn. Seb. et Commerf. — Donnd. zool. Beytr. III. p. 33. — Bechst. Ueberf. der Naturg. Laccp. I. p. 361.

§. 54.

Spec. 14. Test. geometrica L.

Test. geometrica (geometrical tortoise), testa ovata nigra, scutellis elevatis, flavo stellatim radiatis. Shaw gen. Zool. III. p. 20. tab. 2.

Test. geometrica. Schoepf. hist. test. p. 49. tab. 10. excl. syn. Grew. (t. radiata.) — Daud. rept. II. 260. excl. syn. Grew. — Donnd. zool. Beytr. III. p. 28.

Test. geometrica scutellis testae ovatae omnibus elevatis, superne planis, striis flavis velut e centro stellatim concurrentibus. Schneid. Schildkr. p. 352. — Gmel. syst. nat. p. 1044. excl. syn. Grew. (test. radiata) et mus. Adolph. Frid. (E. dorsata?)

Test. geometrica, digitis membrana tectis, testa admodum fornicata, scutellis elevatis, medio flavis flavoque radiatis. Bonat. Erpet. p. 24. tab. 6. fig. 1.

Test. geometrica, scutellis centro flavis, flavoque radiatis. Lacep. quadr. ovip. I. p. 157. tab. 9. excl. syn. mus. Grew. — Bechst. Ueberf. I. p. 229. c. defer. speciminum proprii musei. — Latr. rept. I. 80. II. 279.

Test. geometrica, pedibus posticis palmatis, testae scutellis elevatis truncatis. L. syst. nat. XII. pag. 353.

Test. terrestris Brasiliensis Seb. I. p. 129. tab. 80. fig. 3. — Test. Brasiliensibus Jubeti dicta Klein dispos. quadr. p. 97.

Test. minor amboinensis Seb. I. p. 130. tab. 80. fig. 8.

Test. tessellata minor Raj. syn. anim. quadr. p. 259.

The checkerd shell from Surinam mus. Grew. p. 36. — Test. tessellata ex Surinamia Raj. syn. anim. p. 260.

Test. Jaboti aut Sabuti nigricantibus et flavescantibus figuris geometricis. Piso histor. natur. Ind. III. p. 105. fig. 1.

Cfr. quae priori libello p. 326. nominimus.

Test. Jaboti, Lusitanis Cagado de terra Maregr. Bras. hist. ed. Piso. p. 241. vulgo ad test. tabulatam citata. — Raj. syn. anim. quadr. p. 254.

Test. picta seu stellata. mus. worm. p. 316. — Linn. amoen. acad. p. 139. n. 24. excl. syn. mus. Grew. (test. radiata.)

Gefternute Schildkroete. Gottwald Schildkr.
fig. 13 et 16.

Knorr delic. nat. select. II. p. 127. tab. 52. fig. 3.

(Testudo testa gibba tessellata, subtus postice emarginata, pedibus fissis, cauda brevissima. Brunnich spol. mar. adriat. p. 92. Hab. in Dalmatia.)

?The Hicatee, maior oblonga, testa profundiore, cute loricata, unguibus palmarum quinque plantarum quatuor. Brown hist. Jam. p. 466. rectius fortasse a cel. Shaw ad test. radiatam relata; a Linn. ad geometricam.

Scutella oblonga dicuntur, in centro flava; lineis radiata. Testa 1 ped. 6 poll. long. — Testam tantae magnitudinis neque in speciminibus test. geometricae neque test. radiatae unquam observavi. — Alia species est test. Hecate Dampier. (E. ferrata.)

♂. pullus.

Test. luteola, rotundato-gibbosa, lutea, squamis subgibbosis. Daud. rept. II. p. 277. tab. 25.

Vidi specimen cel. Dandini, testam nimirum juniorem testudinis geometricae scutellis tamen abreptis, quocumque cel. auctor in errorem inductus est.

§. 55.

Spec. 15. Test. radiata Shaw.

Test. radiata (radiated tortoise) testa ovata nigra, scutellis planiusculis, flavo stellatim radiatis. Shaw gen. Zool. III. p. 22. tab. 2. excl.? syn. Brown. — Cfr. §. antec.

Test. Coni, rotunda, alte convexa, scutellis testae sulcatis et complanatis, arcolis subgibbosis rufis, tribus

vertebralibus mediis lateraliter denso flavo-radiatis, lateralibus inferne radiatis. Daud. rept. II. p. 271. c. fig. specim. mus. parif.

Testudo Madagascariensis, alte fornicata, dorfi scutis subpentagone striatis nigris, centro punctato, radiisque luteis. Commerf. quem locum auctores ad test. geometricam retulerunt.

Testudo tessellata maior. mus. Grew. p. 36. tab. 3. fig. 1 et 2. male ad test. geometricam relata. — Raj. syn. anim. quadr. p. 260.

§. 56.

Spec. 16. Test. indica.

α. test. indica Vosm.

Test. indica, testa supra collum reflexa, disci scutellis anterioribus laevibus, margine crenato. Schoepf. hist. test. p. 101. tab. 22. fig. B. speciminis mus. Vosmaer. — Shaw gen. Zool. III. p. 25. tab. 3. fig. 2. — Bechst. Ueberf. der Naturg. Lacep. I. p. 344. — Daud. rept. II. p. 283. — Latr. rept. I. 90. II. 280.

Tortue de Perrault in collectione tabularum pictarum, quae servatur in bibliotheca mus. parif. sub titulo: Velius du museum d'histoire naturelle.

β. test. indica Perrault.

Testudo indica. Perrault mém. de l'acad. des scienc. Tom. III, 1666 — 1699. Pars II, p. 177.; post-hac a nemine visa. — *Tortue grecque de la côte de Coromandel* Lacep.

Récueil des planches sur les sciences et les arts. Vol. VI. tab. 25. fig. 1.

Testudo indica, testa supra collum reflexa, scutellis tribus primoribus tuberosis. Schneid. Schildkroet. pag. 355. ex Perrault. — Schoepf. hist. test. pag. 101. tab. 22. fig. Perrault. — Donndorfii zool. Beytr. III. pag. 29. — Bechst. Uebersetzung der Naturgeschichte. Lacep. I. p. 343. — Shaw. gen. Zool. III. p. 25. tab. 3. fig. 1. ex Perrault.

A d d e n d a.

ad pag. 366.

csr. observ. ad §. 5. p. 367.

Testudinem rostratam Thunb. eandem speciem esse ac Trionychem nostrum javanicum nunc ex autopsia speciminis, quod descripsit cel. vir, edoctus sum: idque specimen quatuor tantum pollices longum in eodem museo Thunbergiano cum majori 8 pollices longo comparare licuit.

ad pag. 290.

Character essentialis Ch. japonicae hic erit:

testa ovali demissa, declive carinata, scutellis planis coriaceis, sterno tredecim areis.

Facies eadem ac in Ch. Mydas, sed scutellis membranaceis abunde differt. Longa descriptio omnino abundaret, quum characteres Ch. Mydas repetendi essent: hoc tamen monendum est, membranam disci in tredecim scutella divisam esse quae satis conspicua. Series scutellorum disci itaque triplex est, uti in reliquis, nequaquam quinquplex, quod male ex icone asseruimus. In specimine sicco nimirum scutella mem-

branacea dorsa tam arcte cum ossibus cohaerent, ut futurae vertebrarum et costarum perluceant: ossa autem in nov. act. Suec. VIII. tab. 7. tanquam scutella delineata sunt, quae figura nos decepit. Bractee 25 marginem obtegunt, durioris quidem substantiae, quam in disco, nec tamen corneae. Margo osseus est, uti in reliquis Cheloniarum speciebus, bractea antica similiter latissima. Commissurae scutellorum marginalium paululum recedunt, inde testa leviter dentata facta est, quae alioquin ovalis, antice cordata, postice retusa. Disci ossea pars, testae magnitudinis ratione habita, minor est in Ch. japonica quam in Ch. Mydas et in specimine, quod vidimus, (vix tamen adulto), costae magna ex parte cartilagine tantum conjunguntur: id quod in icone bene notatum est. Hoc discrimen jam diversitatem specierum indicare videtur, comparatione plurium speciminum uberius investigandam. — De sterno nil monendum videtur, nisi quod album sit et bracteis tredecim, uti sternum Ch. Mydas obtectum. Palmarum unguis unicus: plantae muticae. Caput uti in Ch. Mydas. Mandibula superior repando-sinuata, levissime serrulata, inferior sine speciminis destructione examinari nequibat, inde huius conformatio hic praetermittenda. Cauda cylindrica, non exserta.

Specimen unicum ab incolis insulae Japoniae accepit ill. Thunberg, idque e lacu provenisse ipsi relatum est. Facies omnino testudinum marinarum.

Mensurae.

Longitudo animalis collo parum protracto	-	8 poll. 6 lin.
Longitudo capitis	-	2 poll.
Longitudo testae	-	6 poll.

Longitudo sterni	-	-	-	-	5 poll. 6 lin.
Latitudo capitis	-	-	-	-	1 poll. 7 lin.
Latitudo testae in medio disco	-	-	-	-	6 poll.
Latitudo disci ossei testae	-	-	-	-	2 poll. 8 lin.
Latitudo sterni, exclusis apophyibus	-	-	-	-	2 poll.

ad pag. 424.

Emydem sub nomine *testudinis amboinensis* in museo Adolpho-Fridericiano descriptam examinavi in museo academiae Holmienfis et sic certior factus sum, eam ab *E. dorsata* Schoepf. haud differre. — Summopere dolendum est non nisi fragmenta e museo zoologico Linneano in Suecia asservari, quae insuper difficile agnoscuntur, quum raro Linneus specimenibus propria manu nomen inscripserit.

ad pag. 348.

Emys discolor Thunb. et *Emys planiceps* Schneid. simillimae sunt. Testa prioris, quam in ipso museo Thunbergiano vidi, in eo potissimum difert, quod variegata est.

ad pag. 352.

In museo Upsalienfi vidi testam *Emydis olivaceae*, ibidemque structuram sterni sic notavi:

Sternum bracteis tredecim obtectum est, lobus anticus rotundatus, apice subtruncato, lobus posticus angustior bifidus. Quodque scutellum sulcis cum margine parallelis circumscriptum est.

ad pag. 310.

Testam *Emydis Spengleri* examinavi in museo Thunbergiano ita conformata:

Testa sordide flava. Scutella vertebralia excelsè carinata uti in Emyde dorsata: carinae scutellorum lateralium humiliores, uti vertebralis continuae. Bractea marginis antica ovalis, ceteris angustior. Quodque scutellum marginale in commissura cum proximo profiliens: inde margo anticus dentatus multoque magis margo posticus, scutellis nimirum indentes acutos protractis. Sternum utrinque sinuatum, nigrum, marginibus flavis, testa parum angustius, sed a Wallbaumio, quem antea secuti sumus, multo angustius proditum.

ad pag. 451.

Testudo a cel. Thunberg ad promontorium bonae spei lecta et pro pusilla Linnei ab ipso habita, eadem est ac testudo angulata Dumer. Eam intellexisse Linneum summo-pere credendum, quae enim monet de patria, de statura et usu, de ista specie omnino valent et vix aliam circa urbem. Cap. b. sp. habitare certior me fecit ill. Thunberg. Quare affirmandum videtur, quod jam ediximus, Linneum nimirum e relationibus auctorum, non ex autopsia, animal novisse, et Edwardum secutum esse, historiam testudinis Cap. b. sp. in specimen junius testudinis graecae male transferentem; sicque ex icone Edwardiana falsam descriptionem dedisse. Omnia a Linneo allata synonyma ita excludenda, nam et figura, quam dedit Edward, a testudine angulata satis recedit et certissime test. graecae junioris imago est: falsae omnino sunt aliorum auctorum testudinis pusillae adumbrationes.

Pag. 273. lin. 11. lege quodque pro quoddam.